

执业医师《外科学》辅导：骨折的形态分类 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8A_A9_E7_c22_16585.htm 1.横形、斜形及螺旋形骨折多发生在骨干部。 2.粉碎性骨折骨碎裂成两块以上，称粉碎性骨折。骨折线呈“T”形或“Y”形时，又称“T”形骨折或“Y”形骨折。来源：考试大 3.压缩骨折松质骨因压缩而变形，如椎体和跟骨。来源：考试大 4.星状骨折多因暴力直接着力于骨面所致，如颅骨及髌骨可发生星状骨折。 5.凹陷骨折如颅骨因外力使之发生部分凹陷。来源：考试大 6.嵌入骨折发生在长管骨干骺端皮质骨和松质骨交界处。骨折后，皮质骨嵌插入松质骨内，可发生在股骨颈和肱骨外科颈等处。 7.裂纹骨折如长骨干或颅骨伤后可有骨折线，但未通过全部骨质。来源：考试大 8.青枝骨折多发生在小儿，骨质部分断裂，骨膜及部分骨质未断。 9.骨骺分离通过骨骺的骨折，骨骺的断面可带有数量不等的骨组织，是骨折的一种。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com