

执业医师《外科学》辅导：骨折考试必记的九个考点 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_16613.htm

1、肱骨外科颈为肱骨大结节、小结节移行于肱骨干的交界部位，是松质骨和密质骨的交界处，位于解剖颈（肱骨头周围的环形沟）下2~3cm，有臂丛神经、腋血管在内侧经过，因此骨折可合并神经、血管损伤。

2、骨折的局部表现：三大特有体征：畸形、反常活动、骨擦音或骨擦感；

3、肱骨干骨折合并桡神经损伤时，有垂腕、各手指掌指关节不能伸直，拇指不能背伸以及手背桡侧皮肤有大小不等的感觉麻木区。

4、肱骨髁上骨折最易损伤尺神经，尺神经受伤后，除手部尺侧皮肤感觉消失外，环、小指掌指关节过伸，指间关节屈曲呈爪形，表现为“爪形手”：拇指不能内收，其他四指不能外展及内收。

5、肱骨髁上骨折偶可引起正中神经挤压性损伤，骨折复位后往往能自行恢复。损伤后表现为“猿手”：可出现拇、示、中指不能屈曲，拇指不能外展和对掌，手掌桡侧三个半手指感觉障碍。

6、胫骨中上段的横切面是三棱形，至下1/3呈四方形，两者移行交接处，骨的形态转变，是容易发生骨折的部位。

7、胫骨中下1/3交接处骨折时，易发生骨折延迟愈合或不愈合。腓总神经于腓骨颈外侧走行，骨折易受损伤。

8、髌关节后脱位的典型表现：患肢缩短，髌关节呈屈曲，内收、内旋畸形；髌关节前脱位的典型表现：髌关节呈屈曲，外展、外旋畸形；髌关节中心脱位的典型表现：患肢缩短情况由股骨头内陷的程度决定；由于后腹膜间隙内出血甚多，可以出现失血性休克。

9、断指（肢）再植原则上是越早越

好，应分秒必争。一般常温以6~8小时为限。如伤后时间长，上臂和大腿断离，断指再植可延长至12~24小时。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com