

执业医师《妇产科学》辅导：如何划分异常8种产程曲线异常  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/16/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_16633.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_16633.htm) 潜伏期延长：从规律宫缩至宫口扩张3cm.初产妇约需8小时，最大时限16小时，>16小时称潜伏期延长。 活跃期延长：从宫口扩张大3cm至宫口开全。初产妇约需4小时，最大时限8小时，>8小时称活跃期延长。 活跃期停滞：进入活跃期后，宫口不再扩张2小时以上。 第二产程延长：初产妇超过2小时，经产妇超过1小时尚未分娩。 第二产程停滞：第二产程达1小时胎头下降无进展。 胎头下降延缓：活跃晚期至宫口开大9~10cm，胎头下降速度<1cm/小时。 胎头下降停滞：胎头停留在原处不下降1小时以上。 滞产：总产程超过24小时。  
转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)