

执业医师《内科学》辅导：心力衰竭十个致病因素 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_16649.htm 冠心病已成为欧洲75岁以下心力衰竭患者的主要病因，和我国的情况相似。上海地区最近的调查显示该地区65.8%的心力衰竭是由冠心病所致。在高龄老人中高血压也是心力衰竭一个重要的致病因素。根据病理生理异常，心力衰竭的基本病因可分为：

- 心肌收缩力减弱：心肌炎、心肌病和冠心病等。
- 后负荷（压力负荷）增加：高血压、主动脉瓣狭窄（左心室）、肺动脉高压和肺动脉瓣狭窄（右心室）等。
- 前负荷（容量负荷）增加：二尖瓣狭窄、三尖瓣狭窄、二尖瓣反流、主动脉瓣反流、房间隔缺损、室间隔缺损和代谢需求增加的疾病（甲状腺功能亢进、动静脉瘘等）。
- 感染：呼吸道感染是最常见，最重要的诱因，对老年人尤其如此。感染性心内膜炎作为心力衰竭的诱因也不少见，医学教育网原创常因发病隐密而被漏诊。
- 治疗不当：主要为洋地黄用量不当（过量或不足），以及合并使用了抑制心肌收缩力（异搏定、阻断剂）或导致水钠潴留（大剂量非甾体类消炎药）的药物。
- 心律失常：特别是心室率快的心房颤动和其他快速心律失常。
- 肺动脉栓塞。
- 体力或精神负担过大。
- 合并代谢需求增加的疾病，如甲状腺功能亢进、动静脉瘘等。

感染、心律失常和治疗不当是心力衰竭最主要的诱因。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com