

(西药)历年执业药师资格考试试卷药学专业(二) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/16/2021\\_2022\\_\\_\\_E8\\_A5\\_BF\\_E8\\_8D\\_AF\\_\\_E5\\_8E\\_c23\\_16772.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022___E8_A5_BF_E8_8D_AF__E5_8E_c23_16772.htm) 13 . 孕妇需用解热镇痛药时可选用【A】 A . 对乙酰氨基酚 B.阿司匹林 C.吲哚美辛 D.可的松 E.哌替啶 14 . 老年患者禁用硫酸阿托品的病症是【B】 A.胃溃疡 B.青光眼 C.胆绞痛 D.微循环衰竭 E.有机磷中毒 15 . 遴选非处方药时首先考虑的是【A】 A . 使用安全 B.剂型多样 C . 质量可控 D.说明书详细 E . 价格低廉 16 . 非处方药布洛芬, 不适用于【C】 A.感冒、流感的解热 B.中度的关节疼痛 C.胃酸过多、烧心 D.头痛、牙痛、肌肉痛 E.神经痛和痛经 17 . 限定3日为一疗程的非处方药是【A】 A.用于解热的解热镇痛药 B.用于解痉的胃肠解痉药 C.用于止咳祛痰的镇咳药 D.用于胃酸过多的抗酸药 E . 用于止痛的解热镇痛药 18 . 非处方药给药途径, 主要是【C】 A . 以非肠道给药为主 B.根据病情和医嘱决定 C . 以口服、外用为主 D.以鼻饲给药为主 E . 以灌肠给药为主 19 . 与非处方药西咪替丁同用, 可增加出血危险的处方药是【C】 A.胺碘酮 B.氟卡尼 C.华法林 D.奎尼丁 E.四环素 21.禁用于围产期妇女及12岁以下儿童的药是【A】 A.喹诺酮类药物 B.青霉素类药物 C.头孢菌素类药物 D.中和胃酸药物 E.抗贫血药物 22.药物临床评价是指【E】 A . 对药物临床前研究的一切新药申报资料进行评估 B . 新药上市以后对药品的理化性质和质量的评估 C .新药临床研究在未上市以前进行的临床评估 D.药物药理毒理研究以便为临床使用打基础的评估 E.对上市药品的治疗效果、不良反应等进行评估 22 . 关于药物变态反应的论述, 错误的是【D】 A.药物

变态反应与人自身的过敏体质密切相关 B.药物变态反应绝大多数为后天获得 C.结构类似的药物会发生交叉变态反应 D.药物变态反应大多发生于首次接触药物时 E.药物变态反应只发生在人群中的少数人 23 . 由于与口服降糖药发生相互作用而使降血糖作用减弱的药是【C】 A.磺胺类 B.水杨酸类 C.噻嗪类 D.贝特类 E.香豆素类 24 . 目前推荐的抑制胃酸分泌药物的给药方法是【D】 A . 早晨1次顿服 B. 每12h服1次 C . 每8h服1次 D . 晚上1次顿服 E. 午饭后1次顿服 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)