

(西药)历年度国家执业药师资格考试试卷药剂学部分1 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022___E8_A5_BF_E8_8D_AF__E5_8E_c23_16773.htm

药剂学部分一、A型题（最佳选择题）共24题。每题1分。每题的备选答案中只有一个最佳答案。

1. 有关片剂的正确表述是【E】

A. 咀嚼片是指含有碳酸氢钠和枸橼酸作为崩解剂的片剂
B. 多层片是指含有碳酸氢钠和枸橼酸作为崩解剂的片剂
C. 薄膜衣片是以丙烯酸树脂或蔗糖为主要包衣材料的片剂
D. 口含片是专用于舌下的片剂
E. 缓释片是指能够延长药物作用时间的片剂

2. 有关粉碎的不正确表述是【D】

A. 粉碎是将大块物料破碎成较小颗粒或粉末的操作过程
B. 粉碎的主要目的是减小粒径，增加比表面积
C. 粉碎的意义在于：有利于固体药物的溶解和吸收
D. 粉碎的意义在于：有利于减少固体药物的密度
E. 粉碎的意义在于：有利于提高固体药物在液体、半固体中的分散性

3. 在物料的降速干燥阶段，不正确的表述是【A】

A. 物料内部的水份及时补充到物料的表面
B. 改变空气状态及流速对干燥速度的影响不大
C. 干燥速率主要由受物料内部水份向表面的扩散速率所决定
D. 提高物料的温度可以加快干燥速率
E. 改善物料的分散程度可以加快干燥速率

4. 有关复方乙酰水杨酸片的不正确表述是【D】

A. 加入1%的酒石酸可以有效地减少乙酰水杨酸的水解
B. 三种主药混合制粒及干燥时易产生低共熔现象，所以采用分别制粒法
C. 应采用尼龙筛制粒，以防乙酰水杨酸的分解
D. 应采用5%的淀粉浆作为粘合剂
E. 应采用滑石粉作为润滑剂

5. 有关粉体粒径测定的不正确表述是【D】

A. 用显微镜法测定时，一般需测定200 - 500个粒子
B. 沉

降法适用于100um以下粒子的测定 C . 筛分法常用于45um 以上粒子的测定 D.中国药典中的九号筛的孔径大于一号筛的孔径 E .工业筛用每一英寸长度上的筛孔数目表示 6 . 有关栓剂的不正确表述是【C】 A . 栓剂在常温下为固体 B . 最常用的是肛门栓和阴道栓 C. 直肠吸收比口服吸收的干扰因素多 D . 栓剂给药不如口服方便 E . 甘油栓和洗必泰栓均为局部作用的栓剂 7 . 有关栓剂质量评价及贮存的不正确表述是【D】 A . 融变时限的测定应在37 ±1 进行 B . 栓剂的外观应光滑、无裂缝、不起霜 C . 甘油明胶类水溶性基质应密闭、低温贮存 D . 一般的栓剂应贮存于10 以下 E. 油脂性基质的栓剂最好在冰箱中 (2 - 2) 保存 8 . 下述制剂不得添加抑菌剂的是【C】 A . 用于全身治疗的栓剂 B . 用于局部治疗的软膏剂 C.用于创伤的眼膏剂 D . 用于全身治疗的软膏剂 E . 用于局部治疗的凝胶剂 9 . 有关眼膏剂的不正确表述是【D】 A. 应无刺激性、过敏性 B . 应均匀、细腻、易于涂布 C . 必须在清洁、灭菌的环境下制备 D . 常用基质中不含羊毛脂 E . 成品不得检验出金黄色葡萄球菌和绿脓杆菌 10 . 有关涂膜剂的不正确表述是【C】 A . 是一种可涂布成膜的外用胶体溶液制剂 B . 使用方便 C.处方由药物、成膜材料和蒸馏水组成 D . 制备工艺简单，无需特殊机械设备 E . 常用的成膜材料有聚乙烯缩丁醛和火棉胶等 11.注射于真皮与肌肉之间软组织内的给药途径为【D】 A . 静脉注射 B . 椎管注射 C . 肌肉注射 D. 皮下注射 E .皮内注射 12 . 影响药物溶解度的因素不包括【D】 A . 药物的极性 B. 溶剂 C . 温度 C. 药物的颜色 E . 药物的晶型

转贴于 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com