

抗慢性心功能不全药 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_8A_97_E6_85_A2_E6_80_A7_E5_c23_16947.htm 1.强心苷对哪种心衰的疗效最好A 肺源性心脏病引起B 严重二尖瓣狭窄引起的C 甲状腺机能亢进引起的D 严重贫血引起的E 高血压或瓣膜病引起的E 2.地高辛的 $t_{1/2}=33$ 小时，按每日给予治疗量，问血药浓度何时达到稳态A 3天B 6天C 9天D 12天E 15天B 3.关于强心苷，哪一项是错误的A 有正性肌力作用B 有正性心肌舒张功能C 有负性频率作用D 安全范围小E 用于治疗心衰，也可治疗室上性心动过速B 4.对地高辛过量中毒，引起的心动过速，哪一项是不应采取的措施A 用呋塞米加速排出B 停药C 给氯化钾D 给苯妥英钠E 给地高辛的特异性抗体A 5.强心苷心脏毒性的发生机制是A 激活心脏细胞膜 $\text{Na}^+ \text{K}^+ \text{ATP}$ 酶B 抑制心肌细胞膜 $\text{Na}^+ \text{K}^+ \text{ATP}$ 酶C 增加心肌细胞中的K D 增加心肌细胞中的 Ca^{2+} E 增加心肌细胞中的Na B 6.地高辛治疗心房纤颤的主要作用是A 缩短心房有效不应期B 抑制窦房结C 减慢房室传导D 降低普肯耶纤维的自律性E 直接降低心房的兴奋性C 7.强心苷引起的房室传导阻滞最好选用A 异丙肾上腺素B 氯化钾C 肾上腺素D 阿托品E 苯妥英钠D 8.哪种药物能防止和逆转慢性心功能不全的心室肥厚并能降低病死率A 地高辛B 米力农C 氢氯噻嗪D 硝普钠E 卡托普利E 9.能扩张小动脉，小静脉，作用强大而短暂，可用于治疗慢性心功不全急性发作的扩血管药是A 硝酸甘油B 肼屈嗪C 硝普钠D 硝苯地平E 哌唑嗪C 10.强心苷对哪种心衰无效A 高血压引起B 先天性心脏病引起的C 风湿性心脏病瓣膜病引起的D 肺源性心脏病引起的E 缩窄性心包炎引

起的E 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细
请访问 www.100test.com