

执业医师资格考试协和练习题：异位妊娠 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_168764.htm 执业医师专用训练软件《百宝箱》

1. 输卵管壶腹部妊娠其多见的结果为A 输卵管妊娠流产B 输卵管妊娠破裂C 胚胎可发育至3个月以上D 输卵管妊娠中最危险的一种E 胚胎死亡吸收A

2. 有关宫外孕，下述哪项是正确的A 以间质部分妊娠最常见B 一般子宫增大情况与停经天数相符C 子宫内膜也发生蜕膜变化D 阴道流血多，易致失血性休克E 后穹隆穿刺阴性可否定宫外孕 C

3. 关于异位妊娠的诊断下述哪项最重要A 病史B 腹部检查及阴道检查C 后穹隆穿刺D hC G测定E 诊刮 C

4. 输卵管妊娠应立即手术治疗的是A 阴道持续出血B 休克C 后穹隆穿刺抽出血液D 妊娠试验阳性E 一侧附件扪及包块 B

5. 输卵管妊娠胚胎死亡的可靠依据是A 阴道少量流血B 排出蜕膜管型C 尿妊娠试验阴性D 早孕反应消失E 腹痛减轻 B

6. 异位妊娠是指A 受精卵着床于子宫以外B 受精卵着床于子宫附件以外C 受精卵着床于子宫体腔以外D 受精卵着床于腹腔以外E 受精卵着床于宫颈管以外 C

7. 输卵管妊娠最常见的部位是A 输卵管部B 输卵管峡部C 输卵管间质部D 输卵管间质部与峡部之间E 输卵管壶腹部 E

8. 输卵管妊娠特征下列哪项是错误的A 输卵管峡部妊娠发生破裂的时间较早B 输卵管间质部妊娠破裂时，出血最多，后果最严重C 输卵管妊娠中以壶腹部妊娠最多见D 妊娠试验常（ ）E 后穹隆穿刺常可抽得正常可凝血液 E

9. 关于输卵管妊娠的诊断哪项是错误的A 有时没有停经史诊断仍可成立B 后穹隆穿刺抽不出血液可排除异位妊娠C 阴道有蜕膜管型排出有助诊断D

输卵管妊娠破裂常有晕厥与休克E 盆腔检查时宫颈可有举痛 B
10.急性输卵管妊娠破裂或流产手术应遵循哪项原则A 尽快钳
夹出血处，切除或保留患侧输卵管B 切除子宫C 进行对侧输
卵管整形术D 切除患侧附件E 尽量吸出腹腔血液作自家输血A
转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详
细请访问 www.100test.com