

执业医师资格考试协和练习题：脑血管意外 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/168/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_168777.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_168777.htm) 执业医师专用训练软件《百宝箱》

- 1.何时做头部CT检查，诊断脑梗死阳性率较高  
A 发病6小时以后 B 发病12小时以后 C 发病48小时以后 D 发病18小时以后 E 发病1周以后
- 2.脑出血的预后与哪种因素有关  
A 出血量 B 并发症严重程度 C 出血部位 D 出血量和部位 E 出血量、部位及并发症严重程度
- 3.椎基底动脉系统短暂脑缺血发作，不出现的症状是  
A 失写 B 眩晕 C 构音障碍 D 复视 E 交叉瘫
- 4.颈内动脉系统短暂脑缺血发作最常见的症状是  
A 对侧上肢或下肢的发作性瘫痪 B 对侧偏身感觉障碍 C 失语 D 同侧单眼失明 E 对侧上肢或下肢共济失调
- 5.短暂脑缺血发作的临床表现是  
A 血压突然升高，短暂意识不清，抽搐 B 眩晕、呕吐、耳鸣持续一至数日 C 发作性神经系统功能障碍，24小时内完全恢复 D 昏迷、清醒、再昏迷 E 一侧轻偏瘫，历时数日渐恢复
- 6.下列哪条血管闭塞最易导致偏瘫  
A 小脑下后动脉 B 大脑中动脉 C 脊髓前动脉 D 小脑下前动脉 E 大脑前动脉
- 7.脑血栓形成最常发生于下列哪条动脉  
A 大脑前动脉 B 颈内动脉 C 大脑中动脉 D 大脑后动脉 E 椎基底动脉
- 8.一侧颈内动脉闭塞，可无临床症状，是因为  
A 同侧颈外动脉未闭塞 B 对侧颈内动脉未闭塞 C 正常脑底动脉环可迅速建立侧支循环 D 双侧椎动脉未闭塞 E 颅内血管变异
- 9.脑血栓形成的最常见病因是  
A 高血压 B 脑动脉粥样硬化 C 各种脑动脉炎 D 血压偏低 E 红细胞增多症
- 10.脑梗死临床表现中，不应有的症状或体征  
A 意识不清 B 肢体瘫痪 C 头痛 D 抽搐 E 脑膜

刺激征 E 11. 大脑前动脉阻塞时出现小便失禁，是由于损害了  
A 额极 B 旁中央小叶 C 胼胝体前4/5 D 扣带回 E 额叶底部 B 12.  
患者有偏瘫、偏身感觉障碍和偏盲，最可能有下述哪条血管  
闭塞 A 大脑前动脉 B 大脑中动脉 C 大脑后动脉 D 内听动脉 E  
脊髓前动脉 B 13. 大脑中动脉皮层支闭塞后引起的对侧偏瘫有  
什么特点 A 不伴有颅神经瘫痪 B 偏瘫以下肢为重 C 为均等性  
轻偏瘫 D 偏瘫以下肢较轻 E 上下肢均为0级瘫 D 14. 哪条血管  
闭塞可引起延髓背外侧综合征 A 大脑前动脉 B 大脑中动脉 C  
大脑后动脉 D 椎动脉或小脑后动脉 E 后交通动脉 D 转贴于  
： 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访  
问 [www.100test.com](http://www.100test.com)