

执业医师资格考试协和练习题：糖尿病 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022_E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_168785.htm 执业医师专用训练

软件《百宝箱》 1. 糖尿病是一组病因不明的内分泌代谢病，其共同主要标志是 A 多饮、多尿、多食 B 乏力 C 消瘦 D 高血糖 E 尿糖阳性 D 2.1型糖尿病与2型糖尿病，最主要的区别在于 A 症状轻重不同 B 发生酮症酸中毒的倾向不同 C 对胰岛素的敏感性不同 D 胰岛素的基础水平与释放曲线不同

来源 : www.examda.com E 血糖稳定性不同 D 3. 单卵双生中一人在40岁以前出现糖尿病，另一人也发生糖尿病，其中多数情况为 A 2型糖尿病 B 1型糖尿病 C 继发性糖尿病 D 糖耐量异常 E 妊娠期糖尿病 B 4. 血中直接调节胰岛素分泌而且经常起调节作用的重要因素是 A 游离脂肪酸 B 血糖浓度 C 肾上腺素 D 胃肠道激素 E 血酮体浓度 B 5. 糖尿病性血管病变，最具有特征性的是 A 合并高血压 B 常伴冠状动脉粥样硬化 C 微血管病变 D 周围动脉硬化-下肢坏疽 E 脑血管病变 C 6. 型糖尿病死亡的主要原因是 A 冠心病 B 脑血管病 C 肾小球硬化症 D 酮症酸中毒 E 感染性休克 C 7. 糖尿病眼底病变中，出现哪一种情况最易引起失明 A 微血管瘤 B 新生血管破裂 C 硬性渗出物 D 软性渗出物 E 视网膜出血 B 8. 患者饭后尿糖（ ），空腹尿糖阴性，可诊断为 A 轻型糖尿病 B 糖耐量低减 C 继发性糖尿病性糖尿 D 食后糖尿 E 非葡萄糖糖尿 D 9. 若诊断临床糖尿病，应选择下述哪项检查 A 尿糖 B 空腹血糖 C 糖化血红蛋白 D 口服糖耐量试验 E 空腹胰岛素测定 B 10. 判断糖尿病控制程度较好的指标是 A 空腹血糖 B 饭后血糖 C 糖化血红蛋白 D 空腹血浆

胰岛素含量 E OGTT C 11. 糖尿病饮食治疗下列哪种是正确的
A 病情轻可以不用饮食治疗 B 有并发症者不用饮食治疗 C 用
药治疗时，可不用饮食治疗 D 肥胖者宜给高热量饮食治疗 E
不论病情轻重都需饮食治疗 E 12. 双胍类降糖药最常见的副作用为 A 乳酸性酸中毒 B 低血糖 C 胃肠道反应 D 过敏性皮疹 E 肝功异常 C 13. 磺脲类药物的主要副作用是 A 恶心，呕吐 B 低
血糖反应 C 肝功能损害 D 白细胞减少 E 皮肤瘙痒 B 14. 代谢产
物由胆汁排入肠道，很少经过肾排泄的磺脲类药物是 来源
： www.examda.com A 格列本脲 B 格列吡嗪 C 格列奇特 D 格列
波脲 E 格列喹酮 E 转贴于： 100Test 下载频道开通，各类考试
题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com