

考试大整理药理学真题模拟与解析：第四章影响药物作用的因素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/169/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A7\\_E6\\_c23\\_169527.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/169/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c23_169527.htm)

一、A型题(单项选择题) 1. 影响药物效应的因素是 A. 给药时间 B. 遗传因素 C. 年龄和性别 D. 病理状态 E. 以上都是 答案[E] 2. 引起药物个体差异的常见原因之一是 A. 药物本身的效价 B. 药物本身的效能 C. 患者的药酶活性的高低 D. 药物的化学结构 E. 药物的分子量大小 答案[C] 3. 下列哪种酶缺乏通常与遗传因素有关 A. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶 B. 胆碱酯酶 C. 单胺氧化酶 C. 谷-丙转氨酶 D. 儿茶酚胺氧位甲基转移酶 答案[A] 4. 在临床上做到合理用药，需了解 A. 药物作用与副作用 B. 药物的毒性与安全范围 C. 药物的效价与效能 D. 药物的 $t_{1/2}$ 与消除途径 E. 以上都需要 答案[E] 5. 某两种药物联合应用，其作用大于各药单独作用的代数和，这种作用叫做 A. 增强作用 B. 相加作用 C. 协同作用 D. 互补作用 E. 拮抗作用 答案[A] 6. 对同一药物来讲，下列描述中错误的是 A. 在一定范围内剂量越大，作用越强 B. 对不同个体，用量相同，作用不一定相同 C. 用于妇女时，效应可能与男人有别 D. 成人应用时，年龄越大，用量应越大 E. 小儿应用时，可根据其体重计算用量 答案[D] 7. 麻黄碱短期内用药数次后效应降低，称为 A. 习惯性 B. 快速耐受性 C. 成瘾性 D. 抗药性 E. 以上都不对 答案[B] 8. 安慰剂是 A. 治疗用的主要药剂 B. 治疗用的辅助药剂 C. 用作参考比较的标准治疗药剂 D. 不含活性药物的制剂 E. 是色香味均佳，令患者高兴的药剂 答案[D] 9. 反复用药物后，人体对药物的敏感性降低是因

为 A . 习惯性 B . 成瘾性 C . 依赖性 D . 耐受性 E . 抗药性 答案[D] 10 . 先天性遗传异常对药代动力学影响主要表现在 A . 口服吸收速度不同 B . 药物体内生物转化异常 C . 药物体内分布差异 D . 肾排泄速度异常 E . 以上都不对 答案[B] 11 . 对肝功能不良患者，应用药物时需着重考虑患者 A . 对药物的转运能力 B . 对药物的吸收能力 C . 对药物的排泄能力 D . 对药物的转化能力 E . 以上都不对 答案[D] 12 . 关于撤药症状的描述，正确的是 A . 重复给药时机体对药物的反应性降低 B . 长期用药后机体对药物的反应性增强 C . 连续用药后机体对药物产生依赖性 D . 长期用药后出现中毒症状 E . 长期用药后突然停药时出现的症状 答案[E] 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)