

肾上腺素受体阻断药 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/17/2021_2022__E8_82_BE_E4_B8_8A_E8_85_BA_E7_c23_17035.htm

1.外周血管痉挛性疾病可选用A 山莨菪碱B 异丙肾上腺素C 酚妥拉明D 普萘洛尔E 间羟胺C

2.下列哪个药物能诱发支气管哮喘A 酚妥拉明B 普萘洛尔C 酚苄明D 洛贝林E 阿托品B

3.能翻转肾上腺素升压作用的药物是A M受体阻断药B N受体阻断药C α_1 受体阻断药D α_2 受体阻断药E H₁受体阻断药D

4.普萘洛尔没有下列哪项作用A 降压心肌耗氧量B 增加气道阻力C 抑制肾素释放D 抑制脂肪分解E 增加糖原分解E

5.选择性阻断 α_1 受体的药物是A 酚妥拉明B 妥拉唑啉C 可乐定D 哌唑嗪E α -甲基多巴D

6.普萘洛尔没有下列哪个作用A 减弱心肌收缩力B 松弛支气管平滑肌C 收缩血管D 降低心肌耗氧量E 减少肾素释放B

7.下列 α_1 受体阻断药中哪个兼有 α_2 受体阻断作用A 普萘洛尔B 美托洛尔C 拉贝洛尔D 噻吗洛尔E 吲哚洛尔C

8.关于普萘洛尔的叙述，哪项是正确的A 口服难吸收，生物利用度低B 选择性阻断 α_1 受体C 有内在拟交感活性D 可用于哮喘病患者E 血药浓度个体差异大E

9.女性，50岁，患风湿性心脏病，心功能不全 度。经地高辛治疗4周后病情缓解，但出现恶心，呕吐，黄视等，心电图:P-P和P-R间期延长。测血中地高辛浓度为3.2ng/ml。诊断为地高辛中毒。除立即停药外，还应给下列哪种药物A 利多卡因B 阿托品C 苯妥英钠D 普萘洛尔E 普鲁卡因胺B

10.男，16岁，因患肺炎，给予青霉素治疗。经青霉素皮试为(-)。随即肌注青霉素，但注后立即出现面色苍白，全身湿冷，血压测不到，此时应给何药进行紧急处置A 肾上腺素B 去甲肾上

腺素C 苯海拉明D 间羟胺E 非那根A 100Test 下载频道开通，
各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com