

综合辅导：镇痛药 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/17/2021\\_2022\\_\\_E7\\_BB\\_BC\\_E5\\_90\\_88\\_E8\\_BE\\_85\\_E5\\_c23\\_17048.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/17/2021_2022__E7_BB_BC_E5_90_88_E8_BE_85_E5_c23_17048.htm)

1.吗啡对中枢神经系统的作用是A 镇痛，镇静，催眠，呼吸抑制，止吐B 镇痛，镇静，镇咳，缩瞳，致吐C 镇痛，镇静，镇咳，呼吸兴奋D 镇痛，镇静，止吐，呼吸抑制E 镇痛，镇静，扩瞳，呼吸抑制B

2.吗啡镇痛作用机制是A 阻断脑室，导水管周围灰质的阿片受体B 激动脑室，导水管周围灰质的阿片受体C 抑制前列腺素合成，降低对致痛物质的敏感性D 阻断大脑边缘系统的阿片受体E 激动中脑盖前核的阿片受体B

3.吗啡主要用于A 分娩镇痛B 胃肠绞痛C 肾绞痛D 慢性钝痛E 急性锐痛E

4.吗啡的适应证是A 分娩止痛B 支气管哮喘C 心源性哮喘D 颅脑外伤止痛E 感染性腹泻C

5.心源性哮喘宜选用A 肾上腺素B 去甲肾上腺素C 异丙肾上腺素D 哌替啶E 多巴胺D

6.下列叙述中，错误的是A 可待因的镇咳作用比吗啡强B 等效镇痛剂量的哌替啶对呼吸的抑制程度与吗啡相等C 喷他佐辛久用不易成瘾D 吗啡是阿片受体的激动剂E 吗啡和哌替啶都能用于心源性哮喘A

7.吗啡不用于慢性钝痛是因为A 治疗量就能抑制呼吸B 对钝痛的效果欠佳C 连续多次应用易成瘾D 引起体位性低血压E 引起便秘和尿潴留C

8.镇痛作用最强的药物是A 吗啡B 芬太尼C 哌替啶D 喷他佐辛E 美沙酮B

9.成瘾性最小的镇痛药是A 吗啡B 芬太尼C 哌替啶D 喷他佐辛E 美沙酮D

10.对癌症疼痛的病人应用镇痛药的原则哪项是错误的A 根据疼痛程度选择不同的药物B 对轻度疼痛选用解热镇痛药C 只有在疼痛时才给药D 对重度疼痛应当用强阿片类镇痛药E 保证病人不痛，不考虑成

癮的问题C 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。  
详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)