

综合辅导：抗高血压药 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/17/2021_2022__E7_BB_BC_E5_90_88_E8_BE_85_E5_c23_17050.htm

1.高血压伴有肾功能不全者最好选用A 氢氯噻嗪B 利血平C 卡托普利D 胍乙啶E 哌唑嗪C
2.患隐性糖尿病的高血压患者，不宜选用A 利血平B 氢氯噻嗪C 硝普钠D 卡托普利E 硝苯地平B
3.高血压伴有心绞痛的患者宜选用A 卡托普利B 硝苯地平C 利血平D 氢氯噻嗪E 普萘洛尔E
4.能防止，甚至逆转血管壁增厚和心肌肥大的抗高血压药是A 利尿降压药B α_1 受体阻断药C 钙拮抗药D 血管紧张素转换酶抑制药E α_1 受体阻断药D
5.哪类降压药兼有改善肾功能，心功，逆转心脏肥大，并能明显降低病死率A 可乐宁等中枢性降压药B 钙拮抗剂C 血管紧张素转换酶抑制药D 利尿降压药E 神经节阻断药C
6.关于普萘洛尔，哪项是错误的A 阻断突触前膜 α_2 受体减少去甲肾上腺素释放B 减少肾素的释放C 长期用药一旦病情好转应立即停药D 生物利用度个体差异大E 能诱发支气管哮喘C
7.卡托普利常见的不良反应是A 体位性低血压B 刺激性干咳C 多毛D 阳痿E 反射性心率加快B
8.易引起首剂现象的降压药是A 卡托普利B 利血平C 可乐宁D 哌唑嗪E 硝普钠D
9.抗高血压药最合理的联合是A 氢氯噻嗪 硝苯地平 普萘洛尔B 氢氯噻嗪 拉贝洛尔 普萘洛尔C 肼屈嗪 地尔硫卓 普萘洛尔D 肼屈嗪 哌唑嗪 普萘洛尔E 硝苯地平 哌唑嗪 可乐定A
10.关于可乐定，哪项是错误的A 降压作用与激动延髓I₂咪唑啉受体有关B 因激动中枢 α_2 受体而出现镇静，嗜睡C 能刺激胃肠道分泌，不宜用于有溃疡病的高血压病人D 久用可出现水、钠潴留E 可作为吗啡瘾者的戒毒药使用C

100Test 下载频道

开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com