

药师综合辅导：利尿药 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/17/2021_2022__E8_8D_AF_E5_B8_88_E7_BB_BC_E5_c23_17068.htm

1.关于呋塞米，哪一项是错误的A 利尿作用强，同时能增加肾血流量B 也可用于治疗高血压危象C 利尿作用机制是抑制髓袢升支髓质段的Na、Cl⁻共同转运D 不应当与氨基糖苷类抗生素同时应用E 可用于治疗急性肾功衰竭C

2.噻嗪类利尿药的作用部位是A 髓袢升支粗段皮质部B 髓袢升支粗段髓质部C 髓袢降支粗段皮质部D 髓袢降支粗段髓质部E 髓袢升支粗段全段A

3.关于噻嗪类利尿药，哪项是错误的A 有降血压作用B 利尿作用不受肾小球滤过作用的影响C 能升高血糖D 能升高血浆尿酸浓度E 能抑制碳酸酐酶B

4.伴有糖尿病的水肿病人，不宜选用A 氢氯噻嗪B 呋塞米C 氨苯蝶啶D 螺内酯E 乙酰唑胺A

5.最易引起电解质紊乱的药物是A 氢氯噻嗪B 螺内酯C 呋塞米D 氨苯蝶啶E 乙酰唑胺C

6.长期应用易使血钾升高的药物A 呋塞米B 丁苯氧酸C 利尿酸D 螺内酯E 氢氯噻嗪D

7.最适于治疗肺水肿的药物是A 呋塞米B 氢氯噻嗪C 氨苯蝶啶D 螺内酯E 乙酰唑胺A

8.脑压过高，为预防脑疝最好选用A 呋塞米B 阿米洛利C 螺内酯D 乙酰唑胺E 甘露醇E

9.男34岁，建筑工人，一次事故严重外伤，大量出血，血压下降少尿，经抢救低血压和血容量已纠正后，尿量仍很少，为避免肾功衰竭的进展，应给哪种药物A 氢氯噻嗪B 呋塞米C 螺内酯D 氨苯蝶啶E 卡托普利B

10.女，40岁，因风湿性心脏病出现心衰，心功Ⅲ级，并有下肢水肿，经地高辛治疗后，心功有改善，但水肿不见好转，检查发现：血浆醛固酮水平高，此时最好选用A 呋塞米B 氢氯噻嗪C 螺内

酯D 丁苯氧酸E 氨苯蝶啶C 100Test 下载频道开通，各类考试
题目直接下载。详细请访问 www.100test.com