

合理用药：不宜与酒同服的药物 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/17/2021\\_2022\\_\\_E5\\_90\\_88\\_E7\\_90\\_86\\_E7\\_94\\_A8\\_E8\\_c23\\_17270.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/17/2021_2022__E5_90_88_E7_90_86_E7_94_A8_E8_c23_17270.htm)

(1)服用冬眠灵、苯巴比妥、速可眠、水合氯醛、安定、利眠宁等药物时饮酒，可使中枢抑制作用明显增强，引起严重的呼吸抑制，甚至中毒死亡。(2)丙咪嗪和多虑平是常用的抗抑郁药，若服药期间饮酒，可产生镇定作用，从而降低药效。另外，还可促进脂肪在肝脏的沉积，使小肠蠕动减弱，甚至发生肠麻痹。(3)服用灭滴灵、痢特灵期间饮酒，可发生戒酒反应，表现为面部潮红、心动过速，恶心、呕吐、腹痛、头痛等。二者还可抑制酒精的分解，使其代谢过程的中间产物乙醛降解受阻，使乙醛聚集而引起中毒反应。因此，服药期间或停药两周内不宜饮酒。(4)服用胍乙啶、甲磺丁脲、优降糖、降糖灵或注射胰岛素时饮酒，前者可引起严重体位性低血压，后者可致严重低血糖。服用利福平时饮酒，可加重肝脏损害。服用阿斯匹林类药物时饮酒，可引起或加剧胃出血。服用灰黄霉素时饮酒，可使酒精的中枢抑制作用增强，饮少量酒可导致嗜睡，甚至昏睡。服用维生素B1、B2时饮酒，可使药物的吸收减少。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)