

药理学笔记：利尿药和脱水药 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/17/2021_2022__E8_8D_AF_E7_90_86_E5_AD_A6_E7_c23_17693.htm 掌握呋塞米、氢氯噻嗪、螺内酯的药理作用、临床应用及主要不良反应。熟悉各类常用药物及主要作用部位。了解利尿药的分类。利尿药的作用部位和分类 利尿药是直接抑制肾小管对水、钠的重吸收和促进它们排泄的药物。分类 药物 尿电解质排泄排钠力 主要作用部位 $\text{Na}^+ \text{K}^+ \text{Cl}^-$ (滤过钠量%) 高效类(呋喃苯胺酸) ~ 23 髓袢升支粗段 髓质和皮质部 利尿酸 ~ 23 同上 来源

：考试大 中效类 噻嗪类 ~ 8 髓袢升支类粗段 皮质部 低效类 螺内酯 - ~ 2 远曲小管和集合管 氨苯喋啶 - ~ 2 同上 常用的利尿药 来源：考试大一、强效利尿药有：呋喃苯胺酸(速尿，Furosemide)、利尿酸和布美他尼 [作用] 主要抑制髓袢升支粗段髓质部和皮质部对 Cl^- 的主动再吸收和 Na^+ 的被动再吸收,肾脏稀释功能降低；另一方面由于再吸收到髓质间液的 NaCl 减少,髓质高渗状态降低,尿的浓缩功能受抑制,结果集合管尿液中水的再吸收减少，而产生利尿作用。 [应用] 1、心、肝、肾性各类水肿，多用于其它利尿药无效的各种顽固性水肿。 2、急性肺水肿和脑水肿：常用速尿，速尿通过利尿和扩张血管,减少血容量和细胞外液，进而减少回心血量。 3、预防急性肾功能衰竭：通过利尿，促进有害物质的排泄和减轻肾小管萎缩坏死。 来源：考试大 4、药物中毒时可强迫利尿加速毒物排泄。 [不良反应] 1、水和电解质紊乱 可致血容量降低，低血钾、低血钠、低血氯性碱中毒和高尿酸血症。久用应补钾。 2、胃肠道反应 常见恶心、呕吐、上腹不适

、腹泻，可致胃及十二指肠溃疡。3、耳毒性表现为耳鸣、眩晕或暂时性耳聋。利尿酸对耳毒性比速尿大，更易引起永久性耳聋。本类药物应避免与氨基甙类抗生素合用。4、抑制尿酸排泄，可引起高尿酸血症而诱发痛风。二、中效利尿药效价从弱到强依次为：氢氯噻嗪（Hydrochlorothiazide）[作用] 1、利尿作用 抑制肾小管髓袢升支粗段皮质部Cl⁻、Na⁺的重吸收。2、降压作用 来源：考试大 3、抗利尿作用可能与抑制磷酸二酯酶，使远曲小管和集合管cAMP增加有关。[应用] 1、治疗各种原因所致的水肿，为轻、中度心脏性水肿首选的利尿药。2、防治高血压，作为基础降压药与其它药物合用，减少不良反应，提高疗效。3、肾性尿崩症和加压素无效的中枢性尿崩症 [不良反应] 1、长期应用可引起电解质紊乱，如低血钾 2、反复使用可出现高血糖症、高尿酸血症。三、低效利尿药 醛固酮拮抗剂：安体舒通（螺内酯）；K⁻Ma 交换抑制剂：氨苯喋啶。上述两种为保钾利尿药，利尿作用弱、慢、持久，突出的副作用是高钾血症。1、安体舒通（Spironolactone, Antisterone）[作用] 醛固酮竞争性拮抗剂，对抗醛固酮在远曲小管及集合管的留钠排钾作用，使尿中Na⁺及水排出增加。[应用] 常与噻嗪类使用，用于伴有醛固酮增多的顽固性的心、肝、肾性水肿。来源：考试大 2、氨苯喋啶 [作用] 直接抑制远曲小管及集合管的K⁻Na⁺交换，产生排钠利尿作用。作用比安体舒通强，且不受血中醛固酮的影响。[应用] 常与中效、高效利尿药合用于肝硬化腹水及其它顽固性水肿。脱水药（渗透性利尿药）甘露醇(Mannitol) 山梨醇 葡萄糖(50%) [作用] 1、利尿: 脱水药分子使肾小管腔内渗透压升高，阻止水、Na⁺、K⁺、Cl⁻的再吸

收，而增加尿量的排出。来源：考试大 2、脱水：提高血浆渗透压，使组织中潴留的水分迅速转移到血液。[应用] 1、脑水肿、青光眼。 2、预防急性肾功能衰竭：通过利尿以维持足够尿量和减轻肾间质水肿和肾缺血。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com