中药药剂学练习题：第十七章气雾剂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/17/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E8_8D_AF_E5_c23_17879.htm A型题 1.下列关于气雾剂特点的叙述错误的为（ ） A奏效迅速 B定位作用 C给药剂量准确、副作用小 D生产成本低 E使用方便 2.关于气雾剂的叙述中，正确的为（ ） A 抛射剂的沸点对成品特性无显著影响 B 抛射剂的蒸气压对成品特性无显著影响 C F12、F11各单用与一定比例混合使用性能无差异 D 抛射剂只有氟里昂 E 喷出的雾滴的大小取决于药液的粘度 3.有关抛射剂的叙述中，错误的为（ ） A抛射剂是喷射药物的动力 B抛射剂是气雾剂中药物的溶剂 C抛射剂是气雾剂中药物的稀释剂 D抛射剂是一类高沸点的物质 E抛射剂在常温下蒸气压大于大气压 4泡沫气雾剂是（ ） A溶液型气雾剂 B混悬型气雾剂 C二项气雾剂 D乳剂型气雾剂 E以上均不是 5.吸入型气雾剂药物的主要吸收部位是（ ） A 肺泡管 B 肺泡 C 气管 D 支气管 E 细支气管 6.气雾剂雾滴的大小，影响其在呼吸道不同部位的沉积，一般起局部作用的粒子（ ） A 以0.5－1μm大小为宜 B 以1－2μm大小为宜 C 以2－3μm大小为宜 D 以3－10μm大小为宜 E 以5－12μm大小为宜 7.气雾剂雾滴的大小，影响其在呼吸道不同部位的沉积，一般发挥全身作用的粒子（ ） A 0.5－1μm大小为宜 B 以1－2μm大小为宜 C 以2－3μm大小为宜 D. 以3－10μm大小为宜 E 以5－12μm大小为宜 8.气雾剂质量要求中，吸入气雾剂的药粉粒径应控制在 A 5μm以下 B 10μm以下 C 6μm以下 D 8μm以下 E 9μm以下 9.决定了每次用药剂量的因素 A药物的量 B附加剂的量 C抛射剂的量 D耐压容器的

容积 E定量阀门的容积 10.采用冷灌法充填抛射剂的特点不包括 A生产速度快 B对阀门无影响 C容器中空气易排出 D在低温条件下操作，抛射剂消耗小 E含水产品不宜采用本法 11.关于气雾剂的叙述中，正确的是 A抛射剂用量少，蒸气压高 B加入丙酮，会升高抛射剂的蒸气压 C给药剂量难以控制 D抛射剂可以作为药物的溶剂 E抛射剂的存在，降低了药物的稳定性 12.下列哪种物质不是气雾剂的组成物质 A丙烷 B丙二醇 C月桂醇 D三氯甲烷 E氮气 B型题 （1－4） A异丁烷 B硬脂酸三乙醇胺皂 C维生素C D尼泊金乙酯 E司盘类 1.防腐剂为（ ） 2.抛射剂为（ ） 3.抗氧剂为（ ） 4.助悬剂为（ ） （5－8） A氟氯烷烃类 B聚山梨酯类 C碳氢化合物 D压缩惰性气体 E脂肪酸山梨坦类 5.正丁烷为（ ） 6.N2为（ ） 7.F11为（ ） 8.司盘－65为（ ） 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com