

中药师中药药剂学：胶囊剂复习自测题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/17/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_B8\\_88\\_E4\\_c23\\_17957.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/17/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_B8_88_E4_c23_17957.htm)

一、填空题 1. 软胶囊亦称 ，分为2种情况，所谓无缝软胶囊是用  制备的，而有缝软胶囊是用  制备的。 2. 易风化药物可使胶囊壳 ，而易潮解药物可使胶囊壳 ，故不宜将此类药物制成胶囊。

二、单项选择题 1. 下列宜制成软胶囊的是。 O/W乳剂 芒硝 鱼肝油 药物稀醇溶液 药物水溶液 2. 硬胶囊剂与散剂在质检中不同点为 ( )。 药物水分含量不超过9.0% 装量差异检查 卫生学检查 外观检查 检查药物的粉末细度 3. 滴制法制备软胶囊的丸粒大小取决于 ( )。 基质吸附率 滴头大小 滴头温度 以上均有 4. 下列 ( ) 可以制成胶囊剂。 氯化钾 颠茄酊 亚油酸 以上都可以

三、多项选择题 1. 下列关于硬胶囊壳错误的是 ( )。 胶囊壳主要由明胶组成 制囊壳时胶液中应加抑菌剂 囊壳含水量高于15%时囊壳变软 加入二氧化钛便于识别 囊壳编号数值越大，其容量越大 2. 不宜制成胶囊剂的为 ( )。 药物的稀乙醇溶液 刺激性较强的药物 易潮解的药物 包衣的颗粒剂 含油量高而不宜制成丸、片剂的药物 3. 牡荆油微囊的制法中，正确的为 ( )。 滴制法 复凝聚法 用明胶制成初乳 用明胶与桃胶包囊 用甲醛固化 4. 有关硬胶囊的叙述中，错误的是 ( )。 硬胶囊的号码越小，装量越多 胶囊的囊材中可以加入食用色素 麻醉、剧毒药物填充时，为防止最后者含量不足，应比实际需要量多准备几份 混合后发生共熔的药物不宜制成胶囊剂 胶囊剂除口服外，无其他给药途径 5. 下列 ( ) 不能制成胶囊剂。 KCl 丹参乙醇提液 紫草油 维生素E烟酸酯 刺

五加水提液 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。  
详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)