

中药学辅导：忍冬藤清热，解毒 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/17/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_AD_A6_E8_c23_17965.htm 【药名】：忍冬藤

【拼音】：RENDONGTENG 【英文名】：Japanese

Honeysuckle Stem 【来源】：为双子叶植物药双子叶植物药忍

冬科植物忍冬的茎叶。 【功效】：清热，解毒，通络。 【主

治】：治温病发热，热毒血痢，传染性肝炎，痈肿疮毒，筋

骨疼痛。 【性味归经】：甘，寒。 《别录》：“甘，温，

无毒。” 《药性论》：“味辛。” 《本草拾遗》：“小

寒。” 《本草再新》：“味甘苦，性微寒。” 入心、肺经

。 《要药分剂》：“入肺经。” 《本草再新》：“入心

、肺二经。” 【用法用量】：内服：煎汤，0.3~1两；入丸

、散或浸酒。外用：煎水熏洗、熬膏贴或研末调敷。 【用药

忌宜】：脾胃虚寒，泄泻不止者禁用。 【药物配伍】：配金

银花，清热解毒、通经活络；配连翘，辛凉宣泄、清肺平喘

；配桑叶，疏风清热、宣肺平喘；配白芍，清热行血。 【别

名】：老翁须、金钗股、大薜荔、水杨藤、千金藤（《苏沈

良方》）、鸳鸯草（《墨庄漫录》）、鹭鸶藤（《履岩本草

》）、忍冬草（《证治要诀》）、左缠藤（《余居士选奇方

》）、忍寒草（《洪氏集验方》）、通灵草、蜜桶藤（《土

宿本草》）、金银花藤（《丹溪心法》）、金银藤（《乾坤

生意秘韞》）、金银花杆（《滇南本草》）、甜藤（《本草

述》）、右篆藤（《分类草药性》）、右旋藤（《贵州民间

方药集》）、二花秧、银花秧（《河南中药手册》） 【处方

名】：忍冬藤、金银藤、金银花藤、净制忍冬藤、忍冬草、

银花秧、银花藤、二花藤【药用部位】：本植物的花蕾（金银花）、果实（银花子）亦供药用，各详专条。【动植物资源分布】：分布辽宁、河北、河南、山东、安徽、江苏、浙江、福建、广东、广西、江西、湖南、湖北、四川、贵州、云南、陕西、甘肃等地。药材主产浙江、四川、江苏、河南、陕西、山东、广西、湖南等地。此外安徽、甘肃、湖北、江西、福建、山西、云南、辽宁、河北等地亦产。【药材的采收与储藏】：秋、冬割取带叶的茎藤，扎成小捆，晒干。

【拉丁名】：药材Caulis Lonicerae原植物Lonicera japonica Thunb.【炮制方法】：拣去杂质，用水浸泡，润透，切片，晒干。【考证】：出自《本草经集注》；《苏沈良方》：“忍冬，古人但为补药，未尝治疽。若仓卒求不获，只用干叶为散，每服三方寸匕，甘草方寸匕。酒煮服之亦可，然不及生者。”【生药材鉴定】：干燥茎呈细长圆柱形，直径1.5~6毫米，表面暗红色或灰棕色，有细柔毛，尤以嫩枝为多。皮部易剥落，常撕裂作纤维状。茎上常带有椭圆形、绿黄色的叶，多破碎不全。质坚脆，断面灰白色或黄白色，中央髓部有空隙。气弱，味淡。以外皮枣红色、质嫩带叶者为佳。显微鉴定：细枝横切面：表皮细胞1列；非腺毛单细胞，壁厚，有疣状突起；腺毛柄较长。皮层较宽。中柱鞘纤维成环。韧皮部较窄；射线细胞有含草酸钙簇晶；较老的茎在中柱鞘纤维环以内产生木栓层、以致中柱鞘纤维环及其外侧的皮层，表皮均脱落；韧皮部有少数纤维。形成层成环。木质部导管列；木纤维发达；木射线宽1（-2）列细胞，有纹孔。髓大，髓周细胞壁木化，中央呈空洞。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com