

执业西药师模拟试题：药物分析（四） PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E8_A5_BF_E8_c23_18022.htm [A型题] 1.用滴定分析法测定药物时，停止滴定点称为 A 化学计量点 B 滴定终点 C 等当重点 D 永停点 E 滴定点 2.用NaOH滴定液（0.1000mol/L）滴定20.00ml醋酸（0.1000mol/L）时，需选用的指示剂为 A 淀粉溶液 B 甲基红 C 溶液 D 酚酞 E 甲基橙 3.Fajans法所用的指示剂应是 A.铬黑T B.酚酞 C. 荧光黄 D.邻二氮菲亚铁 E 4.沉淀滴定法能测定的药物有 A Asprin B C D NaCL E Vitamine 5.酸碱指示剂的变色范围PH值计算式为 6.磺溴酞钠的含重测定应选用 A 溴色法 B 高锰酸钾滴定法 C 氧瓶燃烧法 D 荧光分析法 E TLC法 7.氧瓶燃烧法所用的燃烧瓶应是 A 透明玻璃瓶 B 硬质塑料瓶 C 硬质玻璃锥形磨口瓶 D 碘量瓶 E 厚壁玻璃锥形磨口瓶 8.氧瓶燃烧法所用燃烧瓶瓶塞尾部熔封的金属丝应是 A 金丝 B 铜丝 C 银丝 D 铂丝 E 不锈钢丝 9.中国药典（2000年版）规定测定相对密度的药物应是 A 异烟肼 B 硫酸阿托品 C 孢菌素 D 苯甲酸钠 E 十一烯液 10.中国药典（1995年版）规定需测定凝点的药物是 A 甘油 B 石蜡 C 凡士林 D 硬脂酸 E 硬脂酸镁 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com