

执业西药师模拟试题:药剂学(二) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/18/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E8\\_A5\\_BF\\_E8\\_c23\\_18051.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E8_A5_BF_E8_c23_18051.htm) 药剂学(二)[A型题] 1.

下列哪一条不是影响蒸发的因素 A 药液的蒸发面积 B 液体表面压力 C 搅拌 D 加热温度与液体温度的差异 E 液体粘度 2.下列药材粉碎原则中不正确者是 A 粉碎时达到所需要的粉碎度即可 B 粉碎时尽量保存药物组分和药理作用不变 C 植物性药材粉碎前应尽量润湿 D 粉碎毒性和刺激性药物应防止中毒 E 粉碎易燃易爆药物要注意防火防爆 3.《中华人民共和国药典》所用药筛工业筛目数(孔/英寸)，下列错误的是 A 一号筛10 B 二号筛24 C 三号筛60 D 四号筛65 E 五号筛70 4.下列对于药粉粉末等叙述错误者为 A 最粗粉可全部通过一号筛 B 粗粉可全部通过三号筛 C 中粉可全部通过四号筛 D 细粉可全部通过五号筛 E 最细粉可全部通过六号筛 5.根据泊稷叶(Poiseuille)公式并结合实际情况，下列表述错误者为 A 滤渣层两侧压力差值越大，则滤速越大 B 滤过初期，滤过速度与滤器面积成正比 C 滤速与滤材或滤饼毛细管半径成正比 D 滤速与毛细管长度成正比 E 滤速与料液粘度成正比 6.不属于液体药剂者为 A 合剂 B 搽剂 C 灌肠剂 D 酊剂 E 注射剂 7.对液体制剂质量要求错误者为 A 溶液型药剂应澄明 B 分散媒最好使用有机分散媒 C 有效成分浓度应准确稳定 D 乳浊液型药剂应保证其分散项小而均匀 E 制剂应有一定的防腐能力 8.液体药剂规定染菌数限量要求为每克或每毫升内不超过 A 500个 B 300个 C 200个 D 400个 E 100个 9.有关制剂pH对微生物生长影响叙述错误的为 A 霉菌可在较广pH范围内生长 B 霉菌生长最适合pH是4-6 C

细菌通常是在近中性时最易于生长 D 细菌生长适宜pH是5-8 E 碱性范围对霉菌,细菌都不适宜 10.人工合成色素液体药剂中一般用量为 A 1/百万-2/百万 B 2/百万-5/百万 C 5/百万-10/百万 D 5/百万-8/百万 E 8/百万-10/百万 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)