

执业药师考试药理学练习题第三章液体药剂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E8_8D_AF_E5_c23_18071.htm 第三章 液体药剂[A型题]

1 不属于液体药剂者为A合剂B搽剂C灌肠剂D酊剂E注射液

答案2 对液体制剂质量要求错误者为A溶液型药剂应澄明 B分散媒最好用有机分散媒C有效成分浓度应准确、稳定D乳浊液型药剂应保证其分散相小而均匀E制剂应有一定的防腐能力

答案3 液体制剂规定染菌数限量要求为每克或每毫升内不超过A 100个B 200个C 300个D 400个E 500个答案4 有关制剂pH对微生物生长影响叙述错误的是A霉菌可在较广pH范围内生长B霉菌生长最适宜pH是4-6C细菌通常是在中性时最易于生长D细菌生长适宜pH是5-8E碱性范围对霉菌、细菌都不适宜答案5

人工合成色素液体药剂中一般用量为A 1/百万-2/百万B 2/百万-5/百万C 5/百万-10/百万D 5/百万-8百万E 8/百万-10/百万答案6

下列不属于表面活性剂类别的是A脱水山梨醇脂肪酸脂类B聚氧乙烯去水山梨醇脂肪酸脂类C聚氧乙烯脂肪酸脂类D聚氧乙烯脂肪醇醚类E聚氧乙烯脂肪酸醇类答案7

不同HLB值的表面活性剂用途不同，下列错误者为A增溶剂最适范围为15-18以上B去污剂最适范围为13-16C润湿剂与铺展剂最适范围为7-9D大部分消泡剂最适范围为5-8E O/W乳化剂最适范围为8-16答案8

单糖浆为蔗糖的水溶液，含蔗糖量A 85% (g/ml) 或64.7%(g/g) B 86%(g/ml)或64.7%(g/g)C 85%(g/ml) 或65.7%(g/g)D 86%(g/ml)或65.7%(g/g)E 86%(g/ml)或66.7%(g/g)

答案9 有关疏水胶的叙述错误者为A系多相分散体系B粘度与渗透压较大C表面张力与分散媒相近D分散相与分散媒没有亲

和力E Tyndall效应明显答案10 天然高分子助悬剂阿拉伯胶(或胶浆)一般用量是 A 1%-2%B 2%-5%C 5%-15%D 10%-15%E 12%-15%答案 11 微乳(micromulsions)乳滴直径在A 120nmB 140nmC 160nmD 180nmE 200nm 答案 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com