

《中药学》辅导：润下药 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E3_80_8A_E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_c23_18087.htm

1、火麻仁、郁李仁的功效、主治病证：火麻仁：功能润肠通便。本品甘平质润多脂，既能润肠通便，又兼滋养补虚作用，故主治年老体弱、产妇及体虚津血不足的肠燥便秘之证。郁李仁：功能润肠通便，利水消肿。本品亦质润多脂，有较好的润肠通便作用，且本品润肠之中兼能行大肠之气滞，故又多用于大肠气滞，肠燥便秘之证。郁李仁又能利水消肿，可用治水肿胀满，脚气浮肿等证。

2、火麻仁的用量用法：火麻仁：煎服，10-15g，打碎入煎。

峻下逐水药要点：1、甘遂、牵牛子的功效、主治病证：甘遂：功能泻水逐饮，消肿散结。本品泻水逐饮力强大，并善行经隧之水湿，主治水腫、臌脹、胸脇停飲正氣未衰之證；本品尚有逐痰涎的作用，故可用于风痰癲癩；甘遂外用能消肿散结，可用治疮痈肿毒。牵牛子：功能泻下、逐水、去积、杀虫。又能泻肺气，逐痰饮。主治水腫、臌脹；痰飲喘咳；胃腸實熱積滯，大便秘結；蟲積腹痛等證。

2、大戟、芫花、巴豆的功效：大戟：功效泻水逐饮，消肿散结。芫花：功效泻水逐饮，祛痰止咳，杀虫疗疮。巴豆：功效峻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽，蚀疮。甘遂、大戟、芫花、巴豆、牵牛子的用量用法：甘遂：入丸散服，每次0.5-1g。内服须醋制用，以降低毒性。外用适量，生用。大戟：煎服，1.5-3g；入丸散服，每次1g。内服须醋制用，以降低毒性。外用适量，生用。芫花：煎服，1.5-3g；入丸散服，每次0.6g。内服须醋制用，以降低毒性。外用适量。巴

豆：入丸散服，每次0.1-0.3g。大多制成巴豆霜用，以降低毒性。外用适量。牵牛子：煎服，3-9g；入丸散服，每次1.5-3g。牵牛子炒用药性减缓。

4、甘遂、大戟、芫花、巴豆、牵牛子的使用注意：甘遂：体质虚弱及孕妇忌用。反甘草。大戟：体质虚弱及孕妇忌用。反甘草。芫花：体质虚弱及孕妇忌用。反甘草。巴豆：体质虚弱及孕妇忌用。畏牵牛子。牵牛子：孕妇忌用。不宜与巴豆同用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com