

中药炮制驱虫药的炮制 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E7_82_AE_E5_c23_18208.htm 凡能驱除或抑杀寄生虫和药物,称为驱虫药. 本类药物主要用于肠内寄生虫(如蛔虫, 蛲虫, 绦虫, 钩虫等)所至和疾患. 患有肠寄生虫的病人, 每见肚腹胀痛, 不思饮食, 或善食易饥, 或善吃异物, 久之面色发黄, 形体消瘦, 头发焦黄直立等营养不良现象严重出现. 应用驱虫时, 必须根据寄生虫的种类, 病人体质的强弱, 症性的缓急等不同, 分别选用和配伍适当的药物. 本类药一般应在空腹时服, 使药物与寄生虫易于接触, 从而更好地发挥驱虫作用. 并根据大便的正常与否, 适当配伍泻下药, 以促使虫体排出. 由于某些驱虫药具有相当的毒性, 应用时必须注意剂量, 孕妇, 老弱患者都应慎用. 使君子 [来源]为使君子科植物使君子的干燥成熟果实. [性状鉴别]呈纺锤形, 具5条棱, 棱间凹陷. 果皮茶褐色, 光滑, 顶端狭尖, 基部钝圆. 体轻, 不易破碎, 断呈五角形, 壳内含种子1粒, 种子狭纺锤形, 有多数皱纹, 种子皮棕褐色或黑褐色, 种仁黄白色, 有油性. 断面有裂纹. 气微香, 味微甜. [炮制]生用或炒黄. [性味归经]甘, 微温. 归脾, 胃经. [功能主治]驱虫. 用于蛔虫病, 小儿疳积. [用法用量]使君子9-12克, 捣碎入煎剂. 使君子仁6-9克, 多入丸散服或单用作1-2次分服. [使用注意]本品不宜大量服用, 否则引起呃逆, 眩晕, 呕吐等反应. 与热茶同服亦有呃逆现象. 苦楝皮 [来源]为楝科植物川楝和楝的干燥树皮及根皮. [性状鉴别]呈不规则的板状, 槽状或半卷筒状. 外表面灰棕色或褐色, 粗糙, 有交织的皱纹及点状灰棕色皮孔, 内表面类白色或淡黄色. 质韧不易断, 断面纤维性, 呈层片状, 易剥离. 无臭, 味苦. 饮片为半弯形条状, 表皮

灰棕色或灰褐色,常有棕色小麻点,有皱纹,内面淡黄色. [炮制]切丝生用. [性味归经]苦,寒.有小毒.归肝,脾,胃经. [功能主治]驱虫.用于蛔虫病,外治疮癣瘙痒. [用法用量]4.5-9克,1-2次分服.外用适量,研末,用猪脂调敷患处. [使用注意]肝炎,肾炎患者慎服.

川楝子 [别名]金铃子,川楝实. [来源]为楝科川楝的干燥成熟果实. [性状鉴别]呈类球形,表面金黄色,棕黄色具深色小点,果皮革质,果肉松软,淡黄色,果核尖圆形,具6-8条纵棱,内含黑棕色种子6-8粒.气特异,味酸苦.饮片为半球状,不规则的块状. [炮制]生用,炒黄,盐炒. [性味归经]苦,寒.有小毒.归肝,小肠,膀胱经. [功能主治]疏肝,止痛,驱虫.用于胸,胁,腹痛,疝痛,蛔虫症. [用法用量]4.5-9克.

南瓜子 [来源]为葫芦科植物南瓜子的干燥成熟种子. [性状鉴别]呈扁卵圆形.种皮淡黄白色,边缘有棱起的环边,顶端渐尖而平截,底部钝圆,内含种仁一枚,富油性.气微香,味微甘. [炮制]捣碎生用. [性味归经]甘,温.归胃,大肠经. [功能主治]杀虫.用于绦虫病,血吸虫病. [用法用量]60-120克.

榧子 [来源]为红豆杉科植物榧树的干燥成熟种子. [性状鉴别]呈卵圆形,表面灰黄色或淡黄棕色,有纵皱纹,一端钝圆,另一端稍尖.壳质硬,内含种仁一粒,表面皱缩.气微,味微甜而涩. [炮制]捣碎生用. [性味归经]甘,平.归胃,大肠经. [功能主治]消积,去虫.用于小儿疳积,虫积腹痛. [用法用量]9-15克.

槟榔 [来源]为棕榈科植物槟榔的干燥成熟种子. [性状鉴别]呈扁球形或圆锥形.表面淡黄棕色或淡红色,具稍凹下的网状沟纹,底部中心有一凹窝,其侧缘一明显疤痕.质坚硬不易破碎,断面呈棕,白色相间的大理石样花纹.气微,味涩,微苦.饮片为薄片或块粒,薄片有放射状花纹. [炮制]切片或打碎,生用或炒焦. [性味归经]苦,辛,温.归胃,大肠经. [功能主治]消积,驱虫,降气,行水,用于食积腹胀,绦虫病,姜片虫病,

蛔虫病,痢疾后重,疟疾,水肿. [用法用量]3-9克.驱绦虫,姜片虫30-54克. 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com