

药物分析之西药分析异常毒性检查法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E8_8D_AF_E7_89_A9_E5_88_86_E6_c23_18228.htm 本法系将一定剂量的供试品溶液注入小鼠体内或口服给药，在规定时间内观察小鼠死亡情况，以判定供试品是否符合规定的一种方法。供试用的小鼠应健康无伤，体重17~20g，在试验前及试验的观察期内，均应按正常饲养条件饲养。作过本试验的小鼠不得重复使用。供试品溶液的配制除另有规定外，用氯化钠注射液按各药品项下规定的浓度制成供试品溶液。检查法除另有规定外，取上述小鼠5只，按各药品项下规定的给药途径，每只小鼠分别给予供试品溶液0.5ml。给药途径分为以下几种。静脉注射 将供试品溶液注入小鼠尾静脉，应在4~5秒匀速注射完毕。腹腔注射 将供试品溶液注入小鼠腹腔。皮下注射 将供试品溶液注入小鼠腹部或背部两侧皮下。口服给药 将供试品溶液通过适宜的导管，灌入小鼠胃中。结果判断除另有规定外，全部小鼠在给药后48小时内不得有死亡；如有死亡时，应另取体重18~19g的小鼠10只复试，全部小鼠在48小时内不得有死亡。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com