

药学综合知识与技能练习题第四章合理用药 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/18/2021\\_2022\\_\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_AD\\_A6\\_E7\\_BB\\_BC\\_E5\\_c23\\_18240.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E8_8D_AF_E5_AD_A6_E7_BB_BC_E5_c23_18240.htm) 第四章 合理用药 [A型题]

1 所谓合理用药是指 A 对症开药 B 配药准确 C 价格低廉 D 以药物和疾病系统知识为基础，安全、有效、经济、适当地用药 E 安全用药 答案2 合理用药的首要条件是A 安全性 B 有效性 C 经济性D 适用性E 质量合格 答案3 安全性的实质内容是指 A 药物的毒副作用小 B 无不良反应 C 风险/效应尽可能小D 无致畸形 E 无致癌性 答案4 有关经济性的正确含义 A 最满意疗效 B 成本/效果尽可能小 C 少量用药D 使用廉价药品 E 创造收入 答案5 造成药品供需矛盾的主要原因 A 药品产量不足 B 药品供应不足 C 药品进口不足 D 药品使用过量 E 社会支付能力有限 答案6 临床药师的常规工作是直接接触患者并A 书写病历B 监测血药浓度 C 监测药物使用过程和结果 D 参与诊断和治疗 E 提供药疗服务 答案7 下列哪些情况是不合理用药的表现 A 有适应未得到治疗 B 有适应未得到正确诊断 C 患者因副作用而终止用药 D 使用保健品 E 因保健品而死亡 答案8 治疗的主要责任者是 A 药师 B 医师 C 护士 D 麻醉师 E 检验师 答案9 药师工作失误是造成 A 治疗失败的因素 B 乱开药的因素 C 不合理用药的因素 D 用药失败的因素 E 与医师协作失败的因素 答案10 下列对配伍禁忌叙述正确的是 A 两种药物合用发生药理作用改变 B 两种药物合用发生理化反应造成药物失效 C 两种药物合用药理拮抗作用D 两种药物合用发生协同作用E 两种药物合用影响体内吸收和分布 答案11 WHO定义的药物不良反应 A 药物在人用最小剂量下发生的非期望反应 B

药物在人用最小剂量下发生的有害反应 C 药物在正常人用剂量下发生的非期望反应 D 药物在人用最大剂量下发生的有害反应 E 药物在人用最大剂量下发生的非期望反应 答案 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)