

药学综合知识与技能练习题第三章用药指导 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E8_8D_AF_E5_AD_A6_E7_BB_BC_E5_c23_18241.htm

第三章 用药指导[A型题]

- 1 评定患者是否具有依从性的条件是 A 能否听从医师的劝告 B 能否接受医师的治疗 C 能否服从药师的指导 D 能否遵守医师的治疗方案并服从对健康方面的指导 E 能否遵守医院的规定
- 答案2 不依从性的大小与什么有关 A 用药方案的复杂性 B 用药方案的选择性 C 用药方案的时间性 D 用药方案的指导性 E 用药方案的有效性
- 答案3 在治疗中因患者自觉病情好转而终止服药应属 A 治疗失败 B 无意的违背医嘱 C 缺乏用药指导 D 老年性健忘症 E 对药物疗效期望太高
- 答案4 产生不依从性的首要原因是 A 老年性健忘症 B 药物不良反应 C 药物的剂型和规格 D 自行调整剂量 E 缺乏用药指导
- 答案5 皮下注射适用于 A 心内注射 B 快速吸收 C 少量药液（少于2ml） D 疾病较轻 E 用量较大（大于10ml）
- 答案6 口服用药的特点 A 奏效迅速 B 安全、方便 C 吸收完全 D 无首过效应 E 生物利用度高
- 答案7 对药物剂量的描述正确的是 A 成人一日的剂量 B 产生治疗作用的剂量 C 儿童一次的平均用量 D 成人一次的平均用量 E 成人允许使用的最大剂量
- 答案8 一般老年人用药的剂量应为 A 小儿剂量 B 按体重计算 C 按体表面积计算 D 成人剂量 E 成人剂量的3/4
- 答案9 体重20kg的儿童应使用多大剂量的头孢氨苄（已知成人剂量为0.5g） A 200mg B 250mg C 300mg D 400mg E 500mg
- 答案10 所谓药物相互作用一般是指 A 体外的药物相互作用 B 体外的配合变化 C 体内的配合变化 D 体内的药理作用 E 体外的物理化学变化
- 答案11 药物相互作用的结果可使 A 药

效加强或者副作用减少 B 药效和副作用同时加强 C 药效和副作用同时减少 D 疗效和毒性同时增加 E 疗效和毒性同时下降
答案 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com