

执业药师考试药理学练习题第五章散剂、胶囊剂、丸剂 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/18/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c23\\_18296.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E8_8D_AF_E5_c23_18296.htm) 第五章 散剂、胶囊剂、丸剂[A型题]

1 下列关于散剂的叙述哪一项是错误的A散剂是指药物或与适宜辅料经粉碎、均匀混合而制成的干燥粉末状制剂 B中药制剂在临床广泛应用,《中华人民共和国药典》2000年版一部收载散剂59种C散剂按用途可分为内服散剂和局部用散剂D散剂制作单位剂量易控制,便于小儿服用E散剂比表面积大,易分散奏效快答案2 下列关于粉碎的叙述哪一项是错误的A一般的粉碎,主要利用外加机械力,部分的破坏物质分子间的内聚力来达到粉碎的目的B药物粉碎前,必须适当干燥C在粉碎过程中,应把已达到要求细度的粉末随时取出D一般说来,中草药用较高的温度急速加热并冷却后不利于粉碎的进行E一般可用降低温度来提高非晶体药物的粉碎效率 答案3 下列关于单独粉碎的叙述哪一项是错误的A氧化性药物和还原性药物应单独粉碎B贵细药材应单独粉碎C挥发性强烈的药材应单独粉碎D含糖量较多的粘性药材应单独粉碎E细小种子类药材应单独粉碎答案4 下列关于混合粉碎法的叙述哪一项是错误的 A处方中某些药物的性质及硬度相似,则可以将它们掺合在一起进行混合粉碎B混合粉碎可以避免一些粘性药物单独粉碎的困难C混合粉碎可以使粉碎和混合操作结合进行D含脂肪油较多的药物不宜混合粉碎E对混合粉碎可能产生共熔现象者,则视制剂具体要求决定粉碎方法答案5 下列关于粉碎的叙述哪一项是错误的A干法粉碎是把药物经过适当的干燥处理,使药物含水量降低至一定限度再进行粉

碎的方法B湿法粉碎是指药物中加入适量的水或其他液体进行研磨粉碎的方法C药物的干燥温度一般不宜超过105℃，含水量不宜超过10%D湿法粉碎通常液体的选用是以药物遇湿不膨胀、两者不起变化、不妨碍药效为原则E湿法粉碎常用的有“加液研磨法”和“水飞法”

答案6 下列叙述不符合散剂制备方法一般原则的是A组分数目差异大者，采用等量递加混合法B组分数目差异大时，堆密度小者先放入混合容器中，再放入堆密度大者C含低共熔成分时，应避免共熔D剂量小的毒性药品，应制成倍散E含液体组分，可用处方中其他组分或吸收剂吸收

答案7 粉碎器械一般按其主要粉碎作用力分类，下列叙述哪一项是错误的A压片剂、截切剂以截切作用为主B滚压剂以挤压作用为主C万能磨粉机以撞击作用为主D流能磨以研磨作用为主E羚羊角粉碎机以锉削作用为主

答案8 下列关于球磨机的叙述哪一项是错误的A是以研磨与撞击作用为主的粉碎器械B一般要求粉碎物料的直径不应大于圆球直径的1/4-1/9C投料量为筒总容量的30%D圆球加入量为筒总容量的30%-35%E电机转速的实践经验值是临界转速的75%

答案9 工业筛筛孔数目即目数习惯上指A每厘米长度上筛孔数目 B每平方米面积上筛孔数目C每英寸长度上筛孔的数目D每平方英寸面积上筛孔数目E每市寸长度上筛孔数目

答案 10 六号药筛相当于工业筛多少目A 24目B 60目C 80目D 100目E 120目

答案 11 乳香、没药最好采用哪种方法粉碎A水飞法B串研法C串油法D低温法E加液研磨法

答案 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)