

中药制栀子炮制 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_88_A8_E5_c23_18577.htm 【来源】本品为茜草科植物栀子 *Gardenia jasminoides* Ellis 的干燥成熟果实。【炮制方法】一、净制 除去杂质（《药典85》）。二、切制 研碎（《药典85》）。三、炮炙 1．炒制（1）炒黄 取净栀子置锅内，用文火炒至黄褐色时，取出，放凉（《药典85》）。（2）炒焦 取净栀子置锅内，用武火炒至表面焦黑色，喷水少许，再炒干，取出，放凉（《药典85》）。2．制炭 取研碎的栀子，置锅内用武火炒至黑褐色，但须存性，取出，放凉即得（《药典63》）。3．姜制 取栀子碎块，加姜汁拌匀，润透，置锅内，用文火加热，炒至干，取出，放凉。每栀子100kg，用鲜生姜10kg或干姜3kg（《规范》）。4．酒制 将研碎的栀子与黄酒拌匀，焖润至酒尽时，置锅内用文火炒至金黄色为度，取出，放凉。每栀子500g，用黄酒60g（《河南》）。5．姜栀炭 取净栀子串碎后，过大紧眼筛子，置热锅内，不断翻动，用武火炒至黑褐色，取姜汁喷洒均匀，灭净火星，取出晾凉，即得。每栀子100kg，用鲜姜6kg榨汁，剩姜渣加水再榨姜汁，反复操作，取汁12kg，药液合并弃渣备用（《北京》）。【现代研究】经实验研究结果：（1）山栀对兔子结扎总输胆管后血中胆色素出现量有轻度的抑制作用，生山栀与焦山栀之间差别不大。（2）生山栀与焦山栀在兔子注射1.5g的剂量时均有显著缩短血凝时间的作用；而在0.75g的剂量时，生山栀仍有作用，焦山栀则无作用。（3）生山栀和焦山栀对注射酵母液而引起的家兔发热退热试验

，生山梔有明显的解热作用；而焦山梔无作用。（4）生山梔与焦山梔对金黄色葡萄球菌、链球菌、白喉杆菌的抑菌作用相似；对溶血性链球菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌的抑菌作用以生山梔为佳；焦山梔则对痢疾杆菌的抑菌作用较生山梔略强，这一点也和中医用药时大便据薄者用焦山梔是一致的（上海医药工业研究所制剂研究室：全国中西医结合研究工作经验交流会资料选编1960年）。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com