

知识一：药剂学(一) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E7_9F_A5_E8_AF_86_E4_B8_80_EF_c23_18587.htm [A型题] 1.《中华人民共和国药典》最早于何年颁布 A 1950年 B 1951年 C 1952年 D 1953年 E 1954年 2.药师审查处方时发现处方有涂改之处，应采取的正确措施是 A 让患者与处方医师联系写清 B 药师只看清部分予以调配 C 药师与处方医师问明情况可予以调配 D 药师与处方医师联系联系,让处方医师在涂改处签字后方可调配 E 药师向上级药师请示批准后,在涂改处签字后即可调配 3.《中华人民共和国药典》是由 A 国家颁布的药品集 B 国家药品监督管理局制定的药品标准 C 国家药典委员会制定的药物手册 D 国家药品监督管理局制定的药品法典 E 国家编撰的药品规格标准的法典 4.影响浸出效果的决定因素 A 温度 B 浸出时间 C 药材粉碎度 D 浓度梯度 E 溶剂pH值 5.下列那项措施不利于提高浸出效率 A 恰当升高温度 B 加大浓度差 C 选择适宜溶媒 D 浸出一定时间 E 将药材粉碎成细粉 6.利用不同的浓度乙醇选择性浸出药材有效成分，下列表述错误者是 A 乙醇含量大于40%时，能延缓酯类、苷类等成分水解 B 乙醇含量10%以上时具有防腐作用 C 乙醇含量50%以下时，适于浸提苦味质、蒽醌类化合物等 D 乙醇含量50%-70%时，适于浸提生物碱、苷类化合物等 E 乙醇含量90%时，适于浸提挥发油、有机酸、树脂等 7.下列不属于常用浸出方法的是 A 煎煮法 B 渗滤法 C 浸渍法 D 蒸馏法 E 醇提水沉淀法 8.根据Fick第一定律公式，可得知下列叙述错误者为 A 扩散速率与扩散面积、浓度差、温度成正比 B 扩散速率与扩散物质分子半径、液体粘度成正

比 C 扩散系数与扩散物质分子半径成正比 D 扩散系数与阿伏加德罗常数成正比 E 扩散系数与克分子气体常数成正比 9.球磨机粉碎药物时，桶内装药量一般占筒内容积的 A %

75%-80% B 70%-75% C 60%-70 D 70%-80% E 75%-85% 10.浸出方法中的单浸出渗滤法一般包括6个步骤，正确者为 A药材粉碎装桶润湿排气浸渍渗滤 B药材粉碎润湿装桶排气浸渍渗滤 C药材粉碎装桶润湿浸渍排气渗滤 D药材粉碎润湿排气装桶浸渍渗滤 E药材粉碎润湿装桶浸渍排水渗滤

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com