

执业药师考前串讲练习题药理学 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E8_8D_AF_E5_c23_18642.htm A型题（最佳选择题）

，每题1分。每题的备选答案中只有一个最佳答案。1．评价药物吸收程度的药动学参数是 A．药-时曲线下面积 B．清除率 C．消除半衰期 D．药峰浓度 E．表观分布容积2．有降低眼内压作用的药物是 A．肾上腺素 B．琥珀胆碱 C．阿托品 D．毛果芸香碱 来源：考试大 E．丙胺太林3．碘解磷定 A．可以多种途径给药 来源：考试大 B．不良反应比氯磷定少 C．可以与胆碱受体结合 D．可以直接对抗体内聚集的乙酰胆碱的作用 E．与磷酸化胆碱酯酶结合后，才能使酶活性恢复4．滴鼻给药，治疗鼻塞的药物是 A．去甲肾上腺素 B．异丙肾上腺素 C．麻黄碱 D．多巴胺 E．多巴酚丁胺5．肾上腺素受体阻断药可 A．抑制胃肠道平滑肌收缩 B．促进糖原分解 C．加快心脏传导 D．升高血压 E．使支气管平滑肌收缩6．苯巴比妥显效慢的主要原因是 A．吸收不良 B．体内再分布 C．肾排泄慢 D．脂溶性较小 E．血浆蛋白结合率低7．有关左旋多巴药理作用叙述错误的是 A．奏效较慢，用药2 - 3周后才出现体征的改善 B．对轻症及年轻患者疗效较好 C．对肌震颤的疗效较好 D．可促进催乳素抑制因子的释放 E．对肌肉僵直及少动的疗效较好8．哌替啶作为吗啡代用品用于各种剧痛是因为 A．镇痛作用比吗啡强 B．成瘾性较吗啡弱 C．不引起体位性低血压 D．作用时间较吗啡长 E．便秘的副作用轻9．对乙酰氨基酚的药理作用特点是 A．抗炎作用强，解热镇痛作用弱 B．解热镇痛作用缓和持久，抗炎、抗风湿作用很弱

C . 抑制血栓形成 D . 对COX-2的抑制作用比COX-1强 E . 大剂量可减少肾小管对尿酸盐的再吸收

10 . 全身麻醉时 , 为迅速进入外科麻醉期可选用 A . 硫喷妥钠 B . 阿托品 C . 吗啡 D . 异氟烷 E . 恩氟烷

11 . 利多卡因抗心律失常的作用机制是 A . 提高心肌自律性 B . 受体阻断作用 C . 抑制K⁺外流和Na⁺内流 D . 促进K⁺外流和Na⁺内流 E . 改变病区传导速度

12 . 与硝酸甘油扩张血管作用无关的不良反应是 A . 心率加快 B . 搏动性头痛 C . 体位性低血压 D . 升高眼内压 E . 高铁血红蛋白血症

13 . 易引起低血钾的利尿药是 A . 山梨醇 B . 阿米洛利 C . 氢氯噻嗪 来源 : 考试大 D . 氨苯蝶啶 E . 螺内酯

14 . 关于肝素的叙述 , 错误的是 A . 抗凝血作用缓慢而持久 B . 体内、体外均有抗凝血作用 C . 临床用于防治血栓栓塞性疾病 D . 临床用于弥漫性血管内凝血的高凝期 E . 常用给药途径为皮下注射或静脉给药

15 . 属于抗胆碱药的是 A . 异丙阿托品 B . 麻黄碱 C . 沙丁胺醇 D . 异丙肾上腺素 E . 克仑特罗

16 . 不属于糖皮质激素禁忌证的是 A . 曾患严重精神病 B . 活动性消化性溃疡 C . 角膜炎、虹膜炎 D . 创伤修复期、骨折 E . 严重高血压、糖尿病

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com