

药学综合知识习题：常见病及其药物治疗(一) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E8_8D_AF_E5_AD_A6_E7_BB_BC_E5_c23_18682.htm A型题（一）：第1题

下面哪项不是哮喘的发病机理 A 气道慢性炎症 B 支气管平滑肌痉挛 C 肺部血液循环障碍 D 气道粘液分泌增加 E 炎症细胞浸润 正确答案：C 第2题 色甘酸钠主要是抑制哪种炎症细胞

释放活性介质 A 肥大细胞 B 嗜酸粒细胞 C NK细胞 D 血小板 E 单核细胞 来源：考试大 正确答案：A 第3题 下列哪种情况适合用长期口服糖皮质激素治疗 A 哮喘季节性发作的预防 B 伴有发绀的急性重症哮喘 C 慢性哮喘应用其他抗喘药效果不明显者 D 哮喘轻度发作 E 初次发作，未经治疗的哮喘 正确答案

：C 第4题 关于色甘酸钠，不正确的是 A 对哮喘发作病例立时用药可缓解呼吸困难 B 糖皮质激素依赖型哮喘病例经本品治疗后，可减少激素用量 C 可阻止炎症介质释放 D 应用本品时可吸入 β_2 -受体激动剂 E 可直接抑制引起支气管痉挛的某些反射 正确答案：A 第5题 伴高血压的支气管哮喘发作的首选药是 A 舒喘灵 B 糖皮质激素 C 肾上腺素 D 异丙肾上腺素 E 麻黄素 正确答案：A 第6题 重度支气管哮喘最主要的治疗药物是 A 茶碱类 B β_2 -受体激动剂 C 抗胆碱能类 D 糖皮质激素 E 抗过敏类 正确答案：D 第7题 克仑特罗的药理作用是 A 激动 β_1 受体 B 激动 β_2 受体 C 阻断 β_1 受体 D 阻断 β_2 受体 E 对 β_1 、 β_2 受体均有兴奋作用 正确答案：B 第8题 男，驾驶员，30岁，哮喘重度发作经住院治疗缓解，出院后应继续用哪种药物 A 泼尼松口服 来源：考试大 B 丙酸倍氯米松吸入 C 沙丁胺醇吸入 D 肾上腺素注射 E 酮替芬口服 正确答案：B 第9题 横

纹肌溶解症是下列哪种降脂药的不良反应 A HMG-CoA还原酶抑制剂 B 弹性酶 C 烟酸及衍生物 D 贝特类 E ω -3脂肪酸 正确答案：A

第10题 下列关于“他汀类”正确的是 A 可明显降低TG水平，升高TC、LDL水平，同时使血清HDL轻度升高 B 可明显降低TC、LDL水平，中等程度降低TG水平，同时使血清HDL水平轻度升高 C 只有同烟酸、吉非贝齐等合用时才町出现横纹肌溶解症 D 可明显降低TC、LDL和HDL水平，中等程度降低TG水平 E 主要用于高甘油三酯血症 正确答案：B

第11题 参与动脉粥样硬化的发生、发展和病变恶化全过程的代谢紊乱是 A 高血镁 B 高血糖 C 高血脂 D 高血钙 E 高血钠 正确答案：C

第12题 调节血脂药物对血脂代谢的调节作用错误的是 A 阻止胆酸或胆固醇从肠道吸收来源：考试大 B 抑制胆固醇的合成或促进胆固醇的转化 C 促进细胞膜上HDL受体的表达 D 激活脂蛋白代谢酶 E 促进胆固醇转化 正确答案：C

第13题 来源：考试大 主要降TG兼降TC的降脂药不包括 A 烟酸肌醇酯 B 阿昔莫司 C 泛硫乙胺 D 弹性酶 E 益多酯 正确答案：D

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com