

药学综合知识习题：特殊人群的用药指导(二) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E8_8D_AF_E5_AD_A6_E7_BB_BC_E5_c23_18698.htm A型题（二）：第1题

评定患者具有依从性的条件是 A、能接受医师的治疗 B、能服从药师的指导 C、能遵守医师的治疗方案并服从医护人员和药师对其健康方面的指导 D、能遵守医院的规定 E、能听从医师的劝告 正确答案：C 第2题 在治疗中患者自感病情好转而终止服药应属 来源：www.examda.com A、老年性健忘 B、对药物疗效期望过高 C、治疗失败 D、无意的违背医嘱 E、缺乏用药指导 正确答案：D 第3题 对患者用药指导方法包括 A、个例示范法，媒介传播法，座谈讨论法 B、咨询答疑法，专题讲座法，科普教育法 C、个例示范法，咨询答疑法，专题讲座法，科普教育法 D、咨询答疑法，个例示范法，媒介传播法，座谈讨论法 E、个例示范法，媒介传播法，座谈讨论法，咨询答疑法，专题讲座法，科普教育法 正确答案：E 第4题 来源：www.examda.com 按主动转运方式吸收，需要载体参与吸收的药物则吸收减少的是 A、阿司匹林、保泰松、维生素B6、维生素B12 B、维生素B6、维生素B12、维生素C，铁剂，钙剂等 C、乙酰氨基酚、铁剂、钙剂 D、复方新诺明等 E、维生素B12、维生素C、保泰松 正确答案：B 第5题 老年人服用普萘洛尔时应 A、注意减量 B、延长间隔时间 C、注意减量或延长间隔时间 D、注意增量 E、缩短间隔时间 正确答案：C 第6题 老年患者使用洋地黄时比年青人更易出现毒副作用的原因是 A、循环系统功能降低 B、肾脏功能降低 C、肝脏代谢功能降低 D、神经系统功能降低 E、心输出量减少 正确

答案：C 来源：www.examda.com 第7题 老年人服用地高辛临床应引起重视是因为 A、分布容积增大 B、半衰期延长 C、血浓度下降 D、肾排泄加快 E、吸收减慢 正确答案：B 第8题 对新生儿可引起急性中毒需医生配合静脉给药的药物是 A、戊巴比妥 B、地西洋 C、氯霉素 D、磺胺 E、戊巴比妥、地西洋 正确答案：E 第9题 来源：www.examda.com 对新生儿较一般药物更易引起危险，故给药应更慎重的是 A、普萘洛尔 来源：www.examda.com B、维拉帕米 C、普萘洛尔，维拉帕米 D、四环素 E、磺胺 正确答案：C 第10题 对婴幼儿易引起呼吸抑制，不宜应用的药物是 A、阿司匹林等解热镇痛药 B、吗啡、哌替啶等麻醉药品 C、维生素类药物 D、喹诺酮类抗生素 E、补锌制剂 正确答案：B 第11题 以下对婴幼儿有兴奋神经系统作用，使用应谨慎的药物是 A、阿司匹林 B、泰诺 C、氨茶碱 D、泰利必妥 来源：www.examda.com E、环丙沙星 正确答案：C 第12题 儿童期使用利尿剂应采取的方式是 A、间歇给药 B、连续静脉滴注 C、饭前口服 D、饭后口服 E、睡前注射 正确答案：A 第13题 小儿发烧宜选用的解热镇痛药是 来源：www.examda.com A、激素 B、阿司匹林 C、扑热息痛 D、双氯灭痛 E、安乃近 正确答案：C 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com