

药学综合知识习题：特殊人群的用药指导(一) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/18/2021\\_2022\\_\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_AD\\_A6\\_E7\\_BB\\_BC\\_E5\\_c23\\_18709.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E8_8D_AF_E5_AD_A6_E7_BB_BC_E5_c23_18709.htm)

A型题（一）：第1题

依从性的确切定义为 A 病人能遵守医师确定的治疗方案及服从医护人员和药师对健康其他方面的指导 B 病人严格遵医嘱 C 病人按药师交待的方法服药 D 病人按护士交待的方法自我保健 E 病人听从家属的劝告 正确答案：A

第2题 下列哪项不是不依从性产生的后果 A 干扰新药临床试验 B 可危及生命 C 简化治疗方案 D 导致自身的中毒危险 E 造成疾病的治疗失败 正确答案：C

第3题 来源：www.examda.com 导致老年人死亡的主要疾病按系统分居前4位的是 A 心血管疾病、脑血管疾病、恶性肿瘤及呼吸系统疾病 来源：www.examda.com B 脑血管疾病、消化系统疾病、心血管疾病及恶性肿瘤 C 心血管疾病、血液系统疾病、恶性肿瘤及脑血管疾病 D 消化系统疾病、内分泌系统疾病、恶性肿瘤及脑血管疾病 E 脑血管疾病、内分泌系统疾病、心血管疾病及呼吸系统疾病 正确答案：A

第4题 导致老年人死亡居第一位的是 A 冠心病 B 肺心病 C 恶性肿瘤 D 脑血栓 E 脑出血 来源：www.examda.com 正确答案：C

第5题 关于老年人患病，下列哪项叙述是错误的 A 自觉症状常较轻微，临床表现往往不典型 B 机体适应能力低下，一旦发病，病情常迅速恶化 C 常常是多系统同时发病或同一脏器、同一系统发生多种疾病 D 患病时一般不容易出现意识障碍和精神症状 E 老年患者随着病情变化，容易发生并发症 正确答案：D

第6题 肺炎在老年人的死亡原因中占 A 50% 来源

：www.examda.com B 35% C 25% D 20% E 10% 正确答案：B

第7题 在老年人用药中，下列哪种用法是安全的 A 酮康唑与西咪替丁合用 B 氨茶碱和法莫替丁同服 C 使用雅施达(培哌普利)每次4次，每日3次 D 服用甲硝唑期间大量饮用滋补药酒 E 支气管哮喘患者用普萘洛尔治疗高血压、冠心病 正确答案

: B 第8题 在老年人用药中，下列哪种用法是安全的 A 糖尿病患者使用速利尿尿 来源：[www.examda.com](http://www.examda.com) B 卡马西平与红霉素并用 C 使用尼莫地平治疗脑血首痊事、蛛网膜下出血 D 苯妥英钠与西米替丁同用 E 用丽珠得乐代替丽珠肠乐 正确答案

: C 第9题 下列关于新生儿用药的叙述哪项是错误的 A 新生儿体表面积相对成人小，皮肤角化层薄，局部用药应防止吸收中毒 来源：[www.examda.com](http://www.examda.com) B 胃肠道吸收可因个体差异或药物性质不同而有很大差别 C 因新生儿吞咽困难，一般采用皮下或肌肉注射的方法给药 D 新生儿总体液量相对成人高，所以水溶性药物在细胞外液稀释后浓度降低，排出也较慢 E 新生儿的酶系统尚不成熟和完备，用药应考虑肝酶的成熟情况 正确答案：C

第10题 下列关于小儿用药的叙述哪项是错误的 A 婴儿外敷硼酸要防止吸收中毒 B 新生儿对氯霉素的吸收均很完全 C 戊巴比妥钠应有医师配合护士给药 D 早产儿、新生儿应用卡那霉素较成熟儿更易中毒 E 新生儿应用磺胺易促进新生儿黄疸的发生 正确答案：B 第11题 来源

: [www.examda.com](http://www.examda.com) 下列关于小儿用药的叙述哪项是错误的 A 绝不能给睡熟、哭吵或挣扎的婴儿喂药，以免引起吸人性肺炎 B 婴儿常用静脉注射或静脉点滴的方法给药 C 不可将肠溶片或控释片压碎给药 D 儿童正处在生长发育阶段，新陈代谢旺盛，因此可长期大量使用酸碱类药物 E 雄激素的长期应用常使骨骼闭合过早，影响生长和发育 正确答案：D 第12题 下

列关于小儿用药的叙述哪项是正确的 来源：[www.examda.com](http://www.examda.com)

A 因婴幼儿神经系统发育未成熟，故镇静剂的用量应相对偏小  
B 婴幼儿可应用哌替啶镇痛  
C 儿童应尽量避免使用肾上腺皮质激素类药物  
D 儿童应长期大量补充微量元素锌  
E 应将10%葡萄糖注射液作为新生儿的基本补液，因其有营养、解毒作用故可快速、持久滴注  
正确答案：C 来源

：[www.examda.com](http://www.examda.com) 第13题 老年人用卡那霉素时应谨慎，主要因为  
A 老年人肝血流量减少，肝功能下降，从而使血药浓度升高  
B 老年人血浆蛋白含量降低  
C 老年人人体内水分少，药物分布容积降低  
D 老年人肾功能降低，药物半衰期延长，耳、肾毒性增加  
E 老年人易产生肺毒性  
正确答案：D 100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)