

2001年《药理学》试题1 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022_2001_E5_B9_B4_E3_80_8A_c23_18753.htm

一、A型题：1.药物副作用是指：
A：药物蓄积过多引起的反应。B：在治疗剂量时，机体出现与治疗目的无关的不适反应
C：停药后血药浓度已降至阈浓度以下时产生的不适反应D：极少数人对药物特别敏感产生的反应
E：过量药物引起的肝、肾功能障碍2.半数有效量（ED₅₀）是指
A. 药物产生最大效应时所需剂量的一半 B. 引起50%阳性反应（质反应）或50%最大效应（量反应）的浓度或剂量
C. 一半动物产生毒性反应的剂量 D. 产生等效反应所需剂量的一半 E. 常用治疗量的一半
3.关于受体的概念哪项是正确的
A. 与配体结合无饱和性 B. 与配体结合不可逆性 C. 结合配体的结构多样性
D. 是位于细胞核上的基因片断 E. 均有相应的内源性配体
4.下列哪一个药物是肝药酶的诱导剂
A. 氯霉素 B. 对氨基水杨酸 C. 异烟肼 D. 地西洋 E. 苯巴比妥
5.外周血管痉挛性疾病可用何药治疗
A. 酚妥拉明 B. 东莨菪碱 C. 阿托品 D. 普萘洛尔 E. 多巴酚丁胺
6.静脉给与治疗剂量时，可使心率明显加快，收缩压上升，但舒张压下降，总外周阻力下降的药物是
A. 去甲肾上腺素 B. 异丙肾上腺素 C. 肾上腺素 D. 去氧肾上腺素 E. 多巴胺
7.普萘洛尔诱发或加重支气管哮喘的主要原因是
A. 促进肥大细胞释放组胺 B. 直接兴奋支气管平滑肌 C. 阻断支气管平滑肌β₂受体
D. 兴奋平滑肌M受体 E. 阻断支气管平滑肌α₁受体
8.苯海索治疗帕金森病的作用机制主要是
A. 激动黑质 - 纹状体通路的多巴胺受体 B. 抑制外周左旋多巴脱羧转变成多巴胺
C. 促进中枢释放多巴胺 D. 阻断

中枢纹状体的胆碱能受体 E. 阻断外周的胆碱能受体 9. 下述哪一作用是吗啡对中枢神经系统的药理作用 A. 扩瞳 B. 止吐 C. 缩瞳 D. 催眠 E. 麻醉 10. 在治疗量时，主要兴奋大脑皮层的药物是 A. 尼克刹米 B. 洛贝林 C. 贝美洛 D. 咖啡因 E. 二甲弗林

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com