

(西药)历年执业药师资格考试试卷药学专业(四) PDF转换  
可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/18/2021\\_2022\\_\\_\\_E8\\_A5\\_BF\\_E8\\_8D\\_AF\\_\\_E5\\_8E\\_c23\\_18834.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022___E8_A5_BF_E8_8D_AF__E5_8E_c23_18834.htm)

二、B型题(配伍选择题)共80题, 每题0.5分。备选答案在前, 试题在后。每组若干题。每组题均对应同一组备选答案, 每题只有一个正确答案。每个备选答案可重复选用, 也可不选用。[4142] A.通用名 B.法定名 C.商品名 D.注册名 E.习用品 41. “利复星”是左旋氧氟沙星的【C】 42. 《中华人民共和国药典》收录的药品名称是【B】 [4346] A.泻药与雌激素 B.喹诺酮类抗生素 C.四环素类抗生素 D.四环素类抗生素 E.胃动力药物 43.妊娠头3个月, 可以使用的是【E】 44.在饭前半小时服用的是【E】 45.小儿服用后可能引致骨骼损伤的是【B】 46.对正常妇女月经期有影响的是【A】 [4750] A.1年 B.2年 C.3年 D.4年 E.5年 47.麻黄素单方制剂处方留存【B】 48.毒性药品处方留存终【B】 49.一类精神药品处方留存【B】 50.麻醉药品处方留存【C】 [5152] A. DL B. LD C. ED D. Exp. E. MFD 51.生产日期的英文缩写是【E】 52.失效期的英文缩写是【D】 [5356] A.磺胺类药 甲氧苄啶 B.棒酸 阿莫西林 C.依那普利 利尿药 D.亚胺培南 + 西拉司丁 E.氟尿嘧啶 + 醛氢叶酸 53.对细菌叶酸代谢呈双重阻断的是【A】 54.增加药物与TMPS酶结合, 使抗癌效果增强的是【E】 55.抑制内酰胺酶, 对耐药菌株有效的是【B】 56.既增加降压效果, 又减少不良反应的是【C】 [5759] A.酮康唑 B.培哚普利 C.利多卡因 C.法莫替丁 E.卡马西平 57.抗高血压的药是【B】 58.抗心律失常的药是【C】 59.抗癫痫的药是【E】 [6062] A.

利血平 B.氧化镁 C.碳酸氢钠 D.青霉紫 E.红霉素 60 . 可能造成胃穿孔的抗酸药是【B】 61 . 高血压合并消化性溃疡患者不应服的药物是【E】 62 . 急性风湿热合并消化性溃疡患者的首选药是【D】 [ 63 64 ] A.格列齐特 B.苯海索 C.丙咪嗪 D.氯苯那敏 E.甲基多巴 63 . 降血糖的药是【A】 64 . 抗抑郁的药是【C】 [ 65 67 ] A.阿司匹林 B.法莫替丁 C.葡萄糖酸钙 D.碱式硝酸秘复方制剂 E . 盐酸异丙嗪 ( 非那根 ) 65.推荐剂量下常见中枢抑制、乏力等不良反应的是【E】 66.推荐剂量下常见胃肠道不良反应的是【A】 67.推荐剂量下服药期间大便变黑的是【D】 [ 68 70] A.盐酸异丙嗪 B.马来酸氯苯那敏 C.盐酸苯海拉明 D.茶苯海明 E.盐酸地芬尼多 68 . 用于过敏、镇静，但青光眼、癫痫、甲亢患者应慎用的是【A】 69 . 用于防治晕车、晕船、晕机，但青光眼、胃溃疡、妊娠、心动过速者应慎用的是【E】 70 . 用于防治晕车、晕船、晕机，但勿与地西洋和酒精同用，孕妇、新生儿禁用的是【D】 [ 71 74 ] A.对乙酰氨基酚 B.布洛芬 C.西咪替丁 D.氢化可的松 E.氢溴酸右美沙芬 71 . 用于内服、注射是处方药，而外用是非处方药的是【D】 72 . 用于治疗类风湿性关节炎是处方药，而用于解热、镇痛是非处方药的是【B】 73 . 仅用于止咳的非处方药是【E】 74 . 仅用于解热、镇痛的非处方药是【A】 [ 75 78 ] A.普萘洛尔 B.庆大霉素 C.异丙肾上腺素 D.林可霉素 E.己烯雌酚 75 . 可产生肾脏损害的是【B】 76 . 可产生严重心律失常的是【A】 77 . 可产生下一代阴道癌的是【E】 78 . 可产生伪膜性结肠炎的【D】 [ 79 80 ] A.庆大霉素 B.阿米卡星 C.妥布霉素 D.四环素 E.链霉素 79 . Gentamycin 是【A】 80.Tobramycin 是【C】 [ 81 84 ] A.各种白酒 B.乳酪食品 C.葡萄柚汁 D.盐腌海鱼

E.茶叶 81 . 与特非那丁同用可造成心律失常而中毒死亡的是【C】 82 . 与硫酸亚铁同用可生成难溶性化合物的是【E】 83 . 与呋喃唑酮同用会出现呼吸困难、头疼、恶心的是【A】 84 . 与苯乙肼同用会出现高血压危象和脑出血的是【B】 [ 85 86 ] A.四环素 B.氯霉素 C.链霉素 D.庆大霉素 E.黄连素 85. “梅花K”黄柏胶囊事件中，造成范可尼综合征的是【A】 86 . 因新生儿听酶发育不全，可造成灰婴综合征的是【B】 [ 87 89 ] A.西咪替丁 B.雷尼替丁 C.法莫替丁 D.罗沙替丁 E.尼扎替丁 87 . 有性欲减退和阳痿不良反应的是【A】 88 . 国内已有、疗效最强、作用时间最长的是【C】 89.不易透过血脑屏障，中枢神经不良反应较少的是【B】 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)