

中药炮制学知识点辅导：复制法概述 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E7_82_AE_E5_c23_18955.htm 定义 将净选后的药物加入一种或数种辅料，按规定操作程序，反复炮制的方法，称为复制法。目的 1．降低或消除药物的毒性 如半夏、天南星等药物的生品毒性较大，用白矾、生姜等辅料炮制后均能降低药物的毒性。 2．改变药性 如天南星药性辛温，用苦寒的胆汁为辅料炮制后其性由温转凉，味由辛变苦，临床作用亦发生了变化。 3．增强疗效 如半夏、白附子等，用一些辅料炮制后可以增强其临床功效。 4．矫嗅解腥 如紫河车，用酒制后可以除去药物的腥臭气味，便于内服。 操作方法 复制法的操作方法和辅料视加工的具体药物而定。一般有下列一些操作工序：清水浸漂工序 辅料浸泡工序 辅料蒸、煮工序 注意事项 1．药物用水浸漂时，每天换水2~3次。若气温较高，水面易起白沫，可在换水后加入一定量的白矾（一般100kg药物，用白矾2kg），泡一昼夜后，再继续换水浸漂，可以达到防腐作用。 2．药物加辅料浸泡时，一般每天搅拌1~2次，使辅料与药物充分作用。 3．炮制胆南星时，可以用牛、猪、羊的新鲜胆汁或是用胆膏粉加适量清水为辅料。 现代研究 生半夏、生南星、生白附子分别属于国务院颁布的《医疗用毒性药品管理办法》中明令加强管理的毒性中药品种。这些药物的生品具有较强的毒性和刺激性。例如半夏中毒后可以出现呕吐、腹泻、心悸、头痛、出汗、脉弱无力、呼吸不规律等毒性反应，严重者可出现呼吸抑制，最后因呼吸麻痹而死亡。同时生半夏对皮肤粘膜和胃肠道粘膜有较强

的刺激作用和腐蚀作用。天南星的毒性和刺激性与半夏相类。因此生半夏、生南星不宜内服。选用白矾、生姜、甘草等辅料炮制这些药物，可以降低或消除其毒性和刺激性，便于内服。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com