

考试大独家资料:06年国家执业药师资格考试真题17 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E7_c23_183020.htm

药专业知识(一) 中枢兴奋药 一、A型题(单项选择题) 1. 新生儿窒息首选 A. 山梗菜碱 B. 回苏灵 C. 咖啡因 D. 尼可刹米 E. 贝美格 答案[A] 2. 抢救吗啡急性中毒引起的呼吸抑制应首选 A. 可拉明 B. 咖啡因 C. 回苏灵 D. 洛贝林 E. 哌醋甲酯 答案[A] 3. 酒精中毒所致的中枢抑制状态应选用 A. 可拉明 B. 咖啡因 C. 回苏灵 D. 氯醒酯 E. 山梗菜碱 答案[B] 4. 有关咖啡因的描述，错误的是 A. 小剂量兴奋大脑皮质 B. 中毒可致惊厥 C. 能拮抗体内腺苷受体 D. 治疗中枢抑制状态 E. 能扩张脑血管 答案[E] 5. 用作巴比妥类中毒解救的辅助药物是 A. 尼可刹米 B. 二甲弗林 C. 山梗菜碱 D. 贝美格 E. 吡拉西坦 答案[D] 6. 中枢兴奋药主要用于 B. 中枢性呼吸抑制 C. 低血压状态 D. 高血压脑病 E. 心律失常 答案[B] 7. 临床上用于轻度抑郁及小儿遗尿症的药物是 A. 咖啡因 B. 哌醋甲酯 C. 尼可刹米 D. 贝美格 E. 二甲弗林 答案[B] 8. 不直接兴奋呼吸中枢的药物是 A. 尼可刹米 B. 二甲弗林 C. 山梗菜碱 D. 贝美格 E. 咖啡因 答案[C] 9. 使镇痛药在体内灭活减慢 答案[C] 14. 吗啡急性中毒引起的呼吸抑制，最宜选用的中枢兴奋药是 A. 咖啡因 B. 二甲弗林 C. 甲氯芬酯 D. 洛贝林 E. 尼可刹米 答案[E] 15. 中枢兴奋药共同的主要不良反应是 A. 心动过速 B. 血压升高 C. 惊厥 D. 提高骨骼肌张力 E. 头痛眩晕 答案[C] 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com