

考试大独家资料：06年国家执业药师资格考试真题11 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E7_c23_183032.htm

药专业知识(一) 局部麻醉药一、A型题(单项选择题) 1. 局麻药的应用方法有几种A. 一种 B. 两种 C. 五种 D. 无数种 E. 以上均不正确 答案[C] 2. 酯类和酰胺类局麻药的代​​表药分别为A. 普鲁卡因和丁卡因 B. 利多卡因和布比卡因 C. 普鲁卡因和丁卡因 D. 普鲁卡因和利多卡因 E. 利多卡因和麻卡因 答案[D] 5. 注射用局麻药液中加少量肾上腺素的目的是A. 预防手术中出血 B. 预防支气管痉挛 C. 预防心脏骤停 D. 预防局麻药过敏 E. 减少局麻药的吸收 答案[E] 6. 毒性最大的局麻药是A. 普鲁卡因 B. 丁卡因 C. 利多卡因 D. 布比卡因 E. 依替卡因 答案[B] 7. 利多卡因一般不用于A. 表面麻醉 B. 浸润麻醉 C. 传导麻醉 D. 蛛网膜下腔麻醉 E. 硬脊膜外麻醉 答案[D] 8. 普鲁卡因不用于A. 表面麻醉 B. 浸润麻醉 C. 传导麻醉 D. 蛛网膜下腔麻醉 E. 硬脊膜外麻醉 答案[A] 9. 常用于抗心律失常的局麻药是A. 普鲁卡因 B. 丁卡因 C. 利多卡因 D. 布比卡因 E. 以上均不对 答案[C] 10. 可用于各型麻醉的局麻药是A. 普鲁卡因 B. 丁卡因 C. 利多卡因 D. 布比卡因 E. 普鲁卡因胺 答案[C] 11. 浸润麻醉时，在局麻药中加入少量肾上腺素的目的是A. 减少吸收中毒，延长局麻时间 B. 抗过敏 C. 预防心脏骤停 D. 预防术中低血压 E. 用于止血 答案[A] 12. 普鲁卡因一般不用于A. 蛛网膜下腔麻醉 B. 硬膜外麻醉 C. 传导麻醉 D. 浸润麻醉 E. 分离麻醉 答案[E] 13. 丁卡因最常用于A. 浸润麻醉 B. 蛛网膜下腔麻醉 C. 传导麻醉 D. 硬膜外麻醉 E.

表面麻醉答案[E]14. 局部麻醉药中毒时的中枢症状是A. 兴奋B. 抑制C. 先出现兴奋, 后出现抑制D. 先兴奋, 后抑制, 两者交替重叠E. 以上都不对答案[C]15. 下列局麻药在同等剂量时, 它们的毒性是A. 丁卡因>利多卡因>普鲁卡因B. 普鲁卡因>利多卡因>丁卡因C. 丁卡因>普鲁卡因>利多卡因D. 利多卡因>丁卡因>普鲁卡因E. 利多卡因>普鲁卡因>丁卡因答案[A] 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com