

中药图谱大全：大黄图谱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/183/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_9B\\_BE\\_E8\\_c23\\_183060.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_9B_BE_E8_c23_183060.htm)

【药名】：大黄【拼音】：DAHUANG【英文名】：Rhubarb【来源】：为蓼科植物掌叶大黄、唐古特大黄或药用大黄的干燥根或根茎。

【功效】：泻热毒，破积滞，行瘀血。【主治】：治实热便秘，谵语发狂，食积痞满，痢疾初起，里急后重，瘀停经闭，症瘕积聚，时行热疫，暴眼赤痛，吐血，衄血，阳黄，水肿，淋浊，溲赤，痈疡肿毒，疔疮，汤火伤。【性味归经】

：苦，寒。《本经》：“味苦，寒。”《吴普本草》：“神农、雷公：苦，有毒。扁鹊：苦，无毒。李氏：小寒。”《别录》：“大寒，无毒。”《药性论》：“味苦甘

。”入胃、脾、心包、大肠、肝经。《汤液本草》：“入手、足阳明经。”《纲目》：“足太阴，手、足阳明，手、足厥阴五经血分药。”《本草经解》：“入手太阳小肠

经、手少阴心经、手少阳三焦经，兼入足阳明胃经、手阳明大肠经。”【用法用量】：内服：煎汤（用于泻下，不宜久煎），1~4钱，或入丸、散。外用：研末，水或醋调敷。【

用药忌宜】：凡表证未罢，血虚气弱，脾胃虚寒，无实热、积滞、瘀结，以及胎前、产后，均应慎服。《本草经集注》：“黄芩为之使。”《药性论》：“忌冷水。恶干漆。

”《本草经疏》：“凡血闭由于血枯，而不由于热积；寒热由于阴虚，而不由于瘀血；症瘕由于脾胃虚弱，而不由于积滞停留；便秘由于血少肠燥，而不由于热结不通；心腹胀满由于脾虚中气不运，而不由于饮食停滞；女子少腹痛由于

厥阴血虚，而不由于经阻老血瘀结；吐、衄血由于阴虚火起于下，炎烁乎上，血热妄行，溢出上窍，而不由于血分实热；偏坠由于肾虚，湿邪乘虚客之而成，而不由于湿热实邪所犯；乳痈肿毒由于肝家气逆，郁郁不舒，以致营气不从，逆于肉里，乃生痈肿，而不由于膏粱之变，足生大疔，血分积热所发，法咸忌之，以其损伤胃气故耳。” 《本草汇言》

：“凡病在气分，及胃寒血虚，并妊娠产后，及久病年高之人，并勿轻用大黄。” 《本经逢原》：“肾虚动气及阴疽色白不起等证，不可妄用。” 6、黄芩为使。7、忌冷水，恶干漆。8、凡表证未罢，血虚气弱，脾胃虚寒无实热瘀结者忌用、孕妇忌用。【药物配伍】：配芒硝，清热泻毒；配枳实，行气泻下；配附子，温下；配肉桂，泻火凉血；配庶虫，泻火凉血。【别名】：黄良、火参、肤如（《吴普本草》）、将军（李当之《药录》）、锦纹大黄（《千金方》）、川军（《中药材手册》）、峻（藏名） 掌叶大黄，又名：葵叶大黄、北大黄、天水大黄 唐古特大黄又名：鸡爪大黄。

药用大黄，又名：南大黄。药材：北大黄，西宁大黄：二、铨水大黄：南大黄又名：四川大黄、马蹄大黄。同属植物波叶大黄，又称苦大黄。【处方名】：大黄、西大黄、川大黄、锦纹、西锦纹、生锦纹、西吉、川军、大黄粉、制川军、生大黄、生军、制军、熟军、炒大黄、熟大黄、酒大黄、酒军、黑大黄、大黄炭等。处方中写大黄、西大黄、川大黄、西吉、川军均指生大黄。又称生军。为原药去杂质，润透切片生用入药者。偏于泻下。酒大黄又名酒军。为大黄片用黄酒喷淋拌匀，闷润吸尽，再用文火微炒入药者。偏于活血。熟大黄又名制大黄、熟军、制军。为大黄块用黄酒喷

淋拌匀，放瓦罐内密封，再放入锅中隔水炖透，取出晾干入药者。偏于活血。黑大黄又名大黄炭。为大黄片放锅内用微火炒，待冒黄烟，大黄片呈棕黑色时，取出晾凉入药者。偏于止血。

【商品名】：北大黄：为掌叶大黄和唐古特大黄的根茎，包括西宁大黄和铨水大黄两大类。南大黄：又名四川大黄、川军、川大黄、马蹄黄、马蹄大黄等名称。为药用大黄的根茎。状如马蹄。西宁大黄：又名西大黄、西吉。主产于青海、甘肃。可分为蛋吉、片吉、中吉、苏吉四等。蛋吉是指个头匀称，形如鸭蛋者；片吉是指根头部纵切瓣呈片状者；中吉是指根茎叶部的横切段；苏吉是指尾根部，稍加闯光，并具原有的楔状形。多加工成圆锥形或腰鼓形。为北大黄的一种。品种优良，销往全国，并供出口。凉州大黄：又名凉黄、狗头黄。属西宁大黄的一种。产于甘肃武威（凉州）、永登等地。形如狗头，故而得此名称。河州大黄：属于西宁大黄的一种。岷县大黄：属于西宁大黄的一种。锦纹大黄：属于西宁大黄的一种，产于青海同仁、同德等地。因其外表有黄色至棕红色的弯曲线纹，故有“锦纹”和“锦纹大黄”之称。天水大黄：属于西宁大黄的一种，产于甘肃天水一带。铨水大黄：为北大黄的一种，产于甘肃铨水、西礼等地。文县大黄：又名文大黄，为铨水大黄的一种。产于甘肃文县。清水大黄：为铨水大黄的一种，产于甘肃清水地区。庄浪大黄：为铨水大黄的一种，产于甘肃成县。雅黄：为南大黄的一种，产于四川、云南、贵州等地。块黄：为南大黄的一种，产地同雅黄。南川大黄：为南大黄的一种，产于四川盆地南部边缘地区。西藏大黄：产于西藏者。水根大黄：为大黄的较细支根及主根尾段，经加工而成。以上商品均以

质坚实、干燥、断面显锦纹、稍有油性、气清香、味苦而微涩者为佳。【药用部位】：以上植物的茎或嫩苗统称为大黄茎，亦供药用，另详专条。【动植物资源分布】：掌叶大黄分布四川、甘肃、青海、西藏等地。唐古特大黄分布青海、甘肃、四川西北等地。药用大黄分布湖北、四川、云南、贵州等地。北大黄商品有两类：一、西宁大黄：主产于青海同仁、同德等地。此外，尚有凉州大黄、河州大黄和岷县大黄，亦皆属西宁大黄一类。其中凉州大黄又名凉黄、狗头大黄，产于甘肃武威、永登等地。二、铨水大黄：主产于甘肃铨水、西礼等地。属于铨水大黄型的商品，尚有文县大黄、清水大黄、庄浪大黄等数种，产于甘肃文县、成县、清水等地。南大黄又名：四川大黄、马蹄大黄。商品有雅黄、南川大黄等，主产于四川阿坝藏族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州及雅安、南川等地。此外，陕西、湖北、贵州、云南、西藏等地亦产。【药材的采收与储藏】：9~10月间选择生长3年以上的植株，挖取根茎，切除茎叶、支根，刮去粗皮及顶芽，风干、烘干或切片晒干。【拉丁名】：Radix et Rhizoma Rhei Rheum palmatum L., Rheum tanguticum Maxim.ex Reg, Rheum officinale Baill. 【炮制方法】：生大黄（又名：生军）：原药拣净杂质，大小分档，焖润至内外湿度均匀，切片或切成小块，晒干。酒大黄：取大黄片用黄酒均匀喷淋，微焖，置锅内用文火微炒，取出晾干（大黄片100斤用黄酒14斤）。熟大黄（又名：熟军、制军）：取切成小块的生大黄，用黄酒拌匀，放蒸笼内蒸制，或置罐内密封，坐水锅中，隔水蒸透，取出晒干（大黄块100斤用黄酒30~50斤）。亦有按上法反复蒸制2~3次者。大黄炭

：取大黄片置锅内，用武火炒至外面呈焦褐色（存性），略喷清水，取出晒干。《雷公炮炙论》：“凡使大黄，锉蒸，从未至亥，如此蒸七度，晒干。却洒薄蜜水，再蒸一伏时，其大黄劈如乌膏样，于日中晒干用之。” 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)