

中药图谱大全：木瓜图谱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_9B_BE_E8_c23_183082.htm

【药名】：木瓜 **【拼音】**：MUGUA **【英文名】**：Common Floweringquince Fruit **【来源】**：为双子叶植物药蔷薇科植物贴梗海棠的果实。**【功效】**：平肝和胃，去湿舒筋。**【主治】**：治吐泻转筋，湿痹，脚气，水肿，痢疾。**【性味归经】**：酸，温。《雷公炮炙论》：“香，甘酸。”《别录》：“味酸，温，无毒。”《千金食治》：“味酸咸，温，涩，无毒。”《药品化义》：“味酸，性凉。”《玉揪药解》：“味辛，性涩，微寒。”入肝、脾经。李杲：“入手足太阴血分。”《雷公炮制药性解》：“入肺、脾、肝三经。”《本草经疏》：“入足太阴、阳明，兼入足厥阴经。”《本草正》：“入脾、肺、肝、肾四经。”**【用法用量】**：内服：煎汤，1.5~3钱；或入丸、散。外用：煎水熏洗。**【用药忌宜】**：《食疗本草》：“不可多食，损齿及骨。”《医学入门》：“忌铅、铁。”《本草经疏》：“下部腰膝无力，由于精血虚、真阴不足者不宜用。伤食脾胃未虚、积滞多者，不宜用。”**【别名】**：（《尔雅》）、木瓜实（《别录》）、铁脚梨（《清异录》）**【处方名】**：木瓜、宣木瓜、炒木瓜等处方中写木瓜、宣木瓜指生木瓜。为原药材剖开晒干，切片生用入药者。炒木瓜为木瓜片用文火炒至略见焦斑时取出，摊晾后入药者。偏于和胃化湿。**【商品名】**：皱皮木瓜：为植物贴梗海棠的成熟果实。主产于安徽、浙江、湖北等地。光皮木瓜：又名光木瓜、木瓜、木李、土木瓜。为

植物的成熟果实，主产于山东、云南等地。宣木瓜：又名宣州木瓜。为产于安徽宣城者，品质最优，销往全国，并供出口。属于皱皮木瓜。川木瓜：又名花木瓜。产于安徽、四川、浙江等地者。品质亦优，销全国。属于皱皮木瓜。资木瓜：产于湖北资邱者。品质亦佳，销往全国。属于皱皮木瓜。山木瓜：产于山东、湖北、湖南者。云木瓜：产于云南、贵州、西藏者。以上商品以外皮抽皱、色紫红、质坚实、味酸香浓者为佳。【动植物资源分布】：分布华东、华中及西南各地。药材主产安徽、浙江、湖北、四川等地。此外，湖南、福建、河南、陕西、江苏亦产。【药材的采收与储藏】：9~10月采收成熟果实，置沸水中煮5~10分钟，捞出，晒至外皮起皱时，纵剖为2或4块，再晒至颜色变红为度。若日晒夜露经霜，则颜色更为鲜艳。【拉丁名】：药材Fructus Chaenomelis原植物贴梗海棠Chaenomeles lagenaria (Loisel.) Koidz.【炮制方法】：清水洗净，稍浸泡，闷润至透，置蒸笼内蒸熟，乘热切片，日晒夜露，以由红转紫黑色为度。炒木瓜：将木瓜片置锅内，用文火炒至微焦为度。【考证】：出自《雷公炮炙论》。【生药材鉴定】：木瓜，又名：皱皮木瓜。为干燥果实，呈长圆形，常纵剖为卵状半球形，长4~8厘米，宽3.5~5厘米，厚2~8毫米。外皮棕红色或紫红色，微有光泽，常有皱折，边缘向内卷曲。质坚硬，剖开面呈棕红色，平坦或有凹陷的子房室，种子大多数脱落，有时可见子房隔壁。种子三角形，红棕色，内含白色种仁1粒。果肉味酸涩，气微。以个大、皮皱、紫红色者为佳。安徽宣城产者，习称宣木瓜，质量较佳。此外，在少数地区尚有以下列同属植物的果实作木瓜使用：Chaenomeles sinensis (Thouin)

Koehne的果实，使用于华东、西南和河南等地，商品称“光皮木瓜”，干燥后果皮光滑不皱，参见“ ”条。木桃 *C. Lagenaria* (Loisel.) Koidz. Var. *Cathayensis* Rehd. 的果实，使用于西南和陕西等地，参见“子”条。木瓜海棠 *C. Lagenaria* (Loisel.) Koidz. var. *wilsonii* Rehd. 的果实，使用于甘肃。西藏木瓜 *C. Thibetica* Yu的果实，使用于西藏。显微鉴定：果肉（包括花托及果皮）横切面：花托表皮细胞1列，外壁极厚，内含棕色物；皮层厚，外侧有石细胞群，断续排列成环；内侧有外韧型维管束，稀疏环列。果皮外果皮为石细胞层，由10余列石细胞紧密排列而成，石细胞多角形或稍延长，壁厚，孔沟明显；中果皮薄壁细胞壁稍厚，其间贯有细小维管束；内果皮为多列扁平形厚壁细胞，有的含棕色物。粉末：深红棕色。石细胞无色、淡黄色或橙黄色。类圆形、类长方形、长条形、长椭圆形、类三角形或类方形，直径12~82 μm，长至136 μm，壁厚5~20 μm，层纹大多明显，孔沟细，有的胞腔内含棕色或红棕色物。果肉薄壁细胞（原花托部分）壁较厚，极皱缩，细胞界限不清楚，含黄棕色或深棕色物。纤维成束，有时上下层交错排列，直径11~27 μm，壁厚薄不一，木化，常有不规则纵裂纹，胞腔内含棕色物。中果皮薄壁细胞淡黄色或棕色，皱缩。果肉表皮细胞（原花托部分）断面观类长方形，外壁厚14~32 μm，角质化，胞腔内含红棕色物，此外，尚有网纹，螺纹导管，色素块。本品以质坚实、味酸者为佳。【中药化学成分】：含皂甙、苹果酸、酒石酸、柠檬酸、维生素C、黄酮类、鞣质；种子含氢氰酸。果实含皂甙、苹果酸、酒石酸、枸橼酸、维生素C、黄酮类及鞣质。100Test 下载频道开

通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com