

中药图谱大全：白术图谱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_9B_BE_E8_c23_183084.htm

【药名】：白术

【拼音】：BAIZHU

【英文名】：Largehead Atractylodes Rhizome

【来源】：为双子叶植物药菊科植物白术的干燥根茎。

【功效】：补脾，益胃，燥湿，和中。

【主治】：治脾胃气弱，不思饮食，倦怠少气，虚胀，泄泻，痰饮，水肿，黄疸，湿痹，小便不利，头晕，自汗，胎气不安。

【性味归经】：苦甘，温。

《本经》：“味苦，温。”

《别录》：“甘，无毒。”

《药性论》：“味甘辛，无毒。”

入脾、胃经。

《汤液本草》：“入手太阳、少阴，足阳明、太阴、少阴、厥阴经。”

《本草蒙筌》：“入心、脾、胃、三焦四经。”

【用法用量】：内服：煎汤，1.5~3钱；熬膏或入丸、散。

【用药忌宜】：阴虚燥渴，气滞胀闷者忌服。

《药品化义》：“凡郁结气滞，胀闷积聚，吼喘壅塞，胃痛由火，痈疽多脓，黑瘦人气实作胀，皆宜忌用。”

忌桃、李、菘菜、雀肉、青鱼。

【药物配伍】：《本草经集注》：“防风、地榆为之使。”

配人参，健脾生血；配麻黄，发汗解表，散寒祛湿；配桂枝，利水渗湿；配黄芩，清热燥湿；配枳实，消痞健脾。

【别名】：山蓟、杨蓟（《尔雅》）、术（《本经》）、山芥、天蓟（《吴普本草》）、山姜（《广雅》）、乞力伽（《南方草木状》）、山精（《神药经》）、山连（《别录》）、冬白术（《得配本草》）、白大寿、沙邑条根《和汉药考》、杨、蓟《本草纲目》

【处方名】：白术、于术、于白术、于潜术、生白术、炒白术、土白术

、土炒白术、焦白术、焦术、甜冬术等【商品名】：于术，又名于白术、于潜术、烟术，为产于浙江省于潜地区者，品质最优，为地道药材。野于术，又名天生术，为产于浙江省于潜、昌化、天目山一带的野生白术。浙白术：为产于浙江者。坪术：为产于湖南平江者。种术：为产于安徽者。徽术：为产于安徽歙县（旧时徽州）者。品质亦佳。冬术：又名冬白术。为冬季采挖，拣肥满纤维少者，略蒸后晒干之药材。晒术：又名生晒术。为霜降至立冬之间采挖，去除残茎及须根，洗净晒干之药材。烘术：为霜降至立冬期间采挖，去除残茎及须根，洗净烘干之药材。均以根茎粗大、体实无空心、断面黄白色、干燥、无地上茎者为佳。【药用部位】：本植物的苗叶（术苗）亦供药用，另详专条。【动植物资源分布】：现广为栽培，安徽、江苏、浙江、福建、江西、湖南、湖北、四川、贵州等地均有，而以浙江栽培的数量最大。【药材的采收与储藏】：霜降至立冬采挖，除去茎叶和泥土，烘干或晒干，再除去须根即可。烘干者称“烘术”；晒干者称“生晒术”，亦称“冬术”。【拉丁名】：药材Rhizoma Atractylodis Macrocephalae原植物Atractylodes macrocephala Koidz.【炮制方法】：生白术：拣净杂质，用水浸泡，浸泡时间应根据季节、气候变化及白术大小适当掌握，泡后捞出，润透，切片，晒干。炒白术：先将麸皮撒于热锅内，候烟冒出时，将白术片倒入微炒至淡黄色，取出，筛去麸皮后放凉。（每白术片100斤，用麸皮10斤）焦白术：将白术片置锅内用武火炒至焦黄色，喷淋清水，取出晾干。土炒白术：取伏龙肝细粉，置锅内炒热，加入白术片，炒至外面挂有土色时取出，筛去泥土，放凉。（每白术片100斤，用

伏龙肝粉 20斤) 《本草蒙筌》：“白术咀后，人乳汁润之，制其性也，润过陈壁土和炒。” 《本草备要》：“白术，用糯米泔浸，陈壁土炒，或蜜水炒，人乳拌炒。”【考证】：陶弘景；陶弘景：“术乃有两种：白术叶大有毛而作桠，根甜而少膏，可作丸散用；赤术叶细无桠，根小苦而多膏，可作煎用。东境术大而无气烈，不任用。” 《清异录》：“潜山产善术，以其盘结丑怪，有兽之形，因号为狮子术。” 《本草图经》：“术，今处处有之，以嵩山、茅山者为佳。春生苗青色无桠。一名山蓊，以其叶似蓊也，茎作蒿干状，青赤色，长三、二尺以来，夏开花紫碧色，亦似刺蓊，花或有黄白花者；入伏后结子；秋而苗枯，根似姜而傍有细根，皮黑心黄白色，中有膏液，紫色。二月、三月、八月、九月采，暴干，干湿通用，今八月采之。谨按术有二种，陶注《本草》云，白术叶大而有毛，甜而少膏，赤术细苦而多膏是也。其生平地而肥大于众者名杨蓊，今呼之马蓊，然则杨即白术也。今白术生杭、越、舒、宣州高山岗上，叶叶相对，上有毛，方茎，茎端生花，淡紫碧红数色，根作桠生。以大块紫花者为胜，凡古方云术看，乃白术也。” 《本草衍义》：“古方及《本经》只言术，未见分其苍、白二种也，只缘陶隐居言术有两种，自此人多贵白者。今人但贵其难得，惟用白者，往往将苍术置而不用。如古方平胃散之类，苍术为最要药，功尤速。” 《本草蒙筌》：“浙术，俗呼云头术，种平壤，颇肥大，由粪力灌溉。术，俗呼狗头术，产深谷，虽瘦小，得土气充盈。宁国、池州、昌化产者与歙类，境界相邻故也。采根秋月俱同，制度烘曝却异。浙者大块旋曝，每润滞油多；歙者薄片顿烘，竟干燥白甚，凡

用惟白为胜，仍觅歙者尤优。” 《纲目》：“白术，蓊也。吴、越有之，人都取根栽蒔，一年即稠，嫩苗可茹，叶稍大而有毛，根如指大，状如鼓槌，亦有大如拳者，彼人剖开暴干，谓之削术，亦曰片术。陈自良言白而肥者是浙术，瘦而黄者是幕阜山所出，其力劣。昔人用术，不分赤、白，自宋以来，始言苍术苦辛气烈，白术苦甘气和，各自施用，亦颇有理。以秋采者佳，春采者虚软易坏。” 《本经逢原》：“云术肥大气壅，台术条细力薄，宁国狗头术赤皮稍大，然皆栽灌而成，故其气浊，不若于潜野生者气清，无壅滞之患。白术入诸补气药，饭上蒸数次用；入肺胃久嗽药，蜜水拌蒸；入脾胃痰湿药，姜汁拌晒；入健脾药土炒；入泻痢虚脱药，炒存性用；入风痹、痰湿、利水、破血药，俱生用；然非于潜产者，不可生用也。” 【生药材鉴定】：干燥的根茎，呈拳状团块，有不规则的瘤状突起，长5~8厘米，直径2~5厘米。表面灰黄色至棕黄色，有浅而细的纵皱纹。下部两侧膨大似如意头，俗称“云头”。向上则渐细，或留有一段地上茎，俗称“白术腿”。在瘤状突起的顶端，常有茎基残迹或芽痕，须根痕也较明显。质坚硬，不易折断，断面不平坦。烘术的断面淡黄白色，角质，中央时有裂隙。生晒术的断面皮部类白色，木质部淡黄色至黄色，有油点。气香，味甜微辛，略带粘液性。以个大、表面灰黄色、断面黄白色、有云头、质坚实、无空心者为佳。主产浙江、安徽。此外，湖南、湖北、江西、福建等地亦产。以浙江嵊县、新昌地区产量最大；于潜所产品质最佳，特称为“于术”。野于术是产于浙江于潜、昌化、天目山一带的野生白术，一名为“天生术”，该种商品早已绝迹。现售之于术，系将新昌的白术

种子，播种在于潜山区的栽培品，折断面黄白色，有黄色放射状纹理。气清香，甜味强而辣味少。一般认为于潜白术的品质较新昌白术为佳。显微鉴定：根茎横切面：木栓层为多列木栓细胞，夹有1 - 2条断续的石细胞带。皮层较窄。韧皮部狭长，较老根茎，有时可见韧皮纤维束。形成层成环。木质部导管束单股或2 - 3分叉，放射状排列，导管单个或数个径向分布；木纤维束偏于木质部内侧。髓部较大。皮层、射线及髓部均散有溶生性大型油室，内含棕黄色油滴。本品薄壁细胞含菊糖；并充塞微细草酸钙针晶。粉末：淡黄棕色。

菊糖扇形，散在或存在于薄壁细胞中。木栓石细胞类多角形、类长方形或类长圆形，直径37-64 μm ，少数纺锤形者长至117 μm ，壁厚薄不均，有的可见层纹，孔沟及胞腔明显。

草酸钙针晶不规则充塞于薄壁细胞中，长10-32 μm 。纤维长梭形，稍弯曲，边缘不平整，末端斜尖或较平截，直径22 - 34 μm ，壁甚厚，孔沟明显，有的含黄棕色物或针晶。

网纹及具缘纹孔导管直径16 - 56 μm 。此外，有木栓细胞及管胞。【中药化学成分】：含挥发油1.4%，主要成分为苍术醇（Atractylol）、苍术酮（Atractylon）等，并含有维生素A。根茎含挥发油约1.4%，油中含苍术酮（ α -tractylone），尚含白术内酯甲、乙（butenolide A,B）、芹烷二烯酮[selina-4(14),7(11)-dien-8-one]、 β -芹油烯（ β -Se-linene）、桉树萜（aromaden-drene）；另含氧香豆素类

（oxicoumarines）、糖类及树脂等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com