

抗生素类抗感染药：头孢菌素类-头孢特仑新戊酯 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_183227.htm 【摘要】头孢特仑新戊酯属于头孢菌素类抗生素栏目，主要讲述了 药物名称 头孢特仑新戊酯 药物别名 富山龙、头孢特伦酯、头孢特仑酯、托米伦 Tomiron 英文名称 ceftam pivoxil 说明 本品为浅橙色薄膜包衣片，除去包衣后显白色至类白色 功用作用 本品的作用机制是阻断细菌细胞壁的合成。头孢特仑与青霉素结合蛋白（PBP）中的3、1A、1Bs具有很强的结合...。本文重点关注 头孢 作用 感染 支气管炎 等内容，您可以在本页对头孢特仑新戊酯进行讨论【关键字】头孢菌素类抗生素.头孢.作用.感染.支气管炎.头孢特仑新戊酯【全文】药物名称 头孢特仑新戊酯 药物别名 富山龙、头孢特伦酯、头孢特仑酯、托米伦 Tomiron 英文名称 ceftam pivoxil 说明 本品为浅橙色薄膜包衣片，除去包衣后显白色至类白色 功用作用 本品的作用机制是阻断细菌细胞壁的合成。头孢特仑与青霉素结合蛋白（PBP）中的3、1A、1Bs具有很强的结合性，从而发挥杀菌作用。头孢特仑对革兰氏阳性菌、阴性菌均有抗菌作用。尤其对革兰氏阳性菌中的链球菌属、肺炎球菌，革兰氏阴性菌中的大肠杆菌、克雷伯氏菌属，淋球菌、流感嗜血杆菌及厌氧菌脓链球菌属等更显示很强的抗菌作用。对以往口服头孢制剂（先锋IV号、头孢克洛等）不敏感的沙雷氏菌属、吲哚阳性变形杆菌、肠杆菌属、柠檬酸菌属等显示良好的抗菌作用。头孢特仑对各种细菌产生的 β -内酰胺酶稳定，故对产 β -内酰胺酶的菌株有效。敏感菌所致的呼吸道感染，如咽喉炎、扁

桃体炎、急慢性支气管炎、肺炎、弥漫性细支气管炎、支气管扩张（感染时）、慢性呼吸系统疾病的重复感染；泌尿及生殖系统感染，如肾盂肾炎、膀胱炎；淋菌性尿道炎；子宫附件炎、子宫内感染、巴氏腺炎或脓肿；以及中耳炎、副鼻窦炎；口腔感染。用法用量 咽喉炎（咽炎、喉炎）、扁桃体炎（扁桃体周围炎、扁桃体周围脓肿）、急性支气管炎、肾盂肾炎、膀胱炎、子宫附件炎、子宫内膜炎、子宫内感染、巴氏腺炎、巴氏腺脓肿时：成人常规剂量为1日3次，一次50-100 mg，饭后口服。慢性支气管炎、弥漫性细支气管炎、支气管扩张（感染时）、慢性呼吸系统疾病的重复感染、肺炎、中耳炎、副鼻窦炎、淋菌性尿道炎、牙周炎、冠周炎、上颌炎时：成人常规剂量为1日3次，一次100-200 mg，饭后口服。对于重度肾功能不全患者，应慎重服药，适当调整剂量和间隔。用药过量：没有特效解毒剂，一般为对症处理和支持疗法。注意事项 对头孢特仑或本剂成分过敏的患者禁用。对青霉素类或头孢菌素类抗生素过敏的患者；本人或直系亲属中有支气管哮喘、皮肤荨麻疹等过敏体质的患者；严重肾功能不全的患者；口服吞咽困难或非经口摄取营养、全身状态恶化的患者慎用。对实验室检查结果的影响：除尿糖试纸外的尿糖比色实验、本尼迪特（Benedict）实验等利用还原法进行的尿糖检查实验可出现假阳性反应。服药期间，直接库姆斯氏（Coombs）实验可显示阳性结果。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com