

抗生素类抗感染药：头孢菌素类-头孢罗奇 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_183233.htm 【摘要】头孢罗奇属于头孢菌素类抗生素栏目，主要讲述了 药物名称 头孢罗奇 药物别名 头孢西尔 Procef、Cefzi1 英文名称 Cefproxil 说明片剂：每片250mg，500mg。口服混悬液：每5ml含125mg或500mg 功用作用 本品属非酯类第1代口服头孢菌素，对革兰阳性和革兰阴性菌均有抗菌活性，如链球菌、甲氧西林敏感金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、单核细...。本文重点关注 头孢 口服 抗菌 活性 等内容，您可以在本页对头孢罗奇进行讨论【关键字】头孢菌素类抗生素.头孢.口服.抗菌.活性.头孢罗奇【全文】药物名称 头孢罗奇 药物别名 头孢西尔 Procef、Cefzi1英文名称 Cefproxil说明片剂：每片250mg，500mg；口服混悬液：每5ml含125mg或500mg功用作用 本品属非酯类第1代口服头孢菌素，对革兰阳性和革兰阴性菌均有抗菌活性，如链球菌、甲氧西林敏感金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、单核细胞增多性李斯德菌；大肠杆菌、奇异变形杆菌、肺炎克雷伯杆菌、流行性感嗜血杆菌、卡他莫拉菌以及厌氧菌（如艰难杆菌、消化链球菌）都有很强的抗菌活性；对部分肠球菌、产黑色素类杆菌、真杆菌属也有抗菌活性。本品对革兰阳性菌的作用优于其它口服头孢菌素。敏感菌引起的咽炎、扁桃体炎、中耳炎、急慢性支气管炎，皮肤及软组织、尿路等感染。用法用量 口服：成人通常为500mg，每日1~2次，连续10d；12岁以下儿童的口服混悬液，推荐剂量为15mg / kg，每日2次。注意事项（1）青霉素过敏者慎用；

(2) 严重肾功能不全者应减量使用 100Test 下载频道开通，
各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com