

抗生素类抗感染药：头孢菌素类-美爱克 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/183/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_97\\_E7\\_94\\_9F\\_E7\\_B4\\_A0\\_E7\\_c23\\_183243.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_183243.htm) 【摘要】美爱克属于头孢菌素类抗生素栏目，主要讲述了敏感菌引起的感染，如毛囊炎、疖、痈、传染性脓疱疮、丹毒、蜂窝织炎、淋巴管（结）炎、化脓性甲沟炎、皮下脓肿、汗腺炎、感染性粉瘤、慢性脓皮症。乳腺炎，肛周脓肿，外伤、手术创伤等继发感染。咽喉炎（咽喉脓肿），急慢性支气管炎，扁桃体炎（扁桃体周围炎、扁桃体周围脓肿）、支气管扩张（感染时）、慢性呼吸系统疾病...。本文重点关注引起感染脓肿患者等内容，您可以在本页对美爱克进行讨论【关键字】头孢菌素类抗生素.引起.感染.脓肿.患者.美爱克【全文】药物名称 美爱克 药物别名 头孢妥仑 cefditoren pivoxil 英文名称 Meiact 说明 本品除有效成分外还含有添加物聚磷酸钠2 mg和聚乙烯二醇。功用作用 本药为头孢菌素类抗生素，对以下病原菌有效：葡萄球菌属、链球菌属、消化链球菌属、卡他摩拉菌、痤疮丙酸杆菌、大肠杆菌、枸橼杆菌属、克雷伯杆菌属、肠杆菌属、沙雷氏菌属、变形杆菌属（奇异变形杆菌、普通变形杆菌）、摩根氏杆菌属、普罗威登氏菌属、流感嗜血杆菌、拟杆菌属。敏感菌引起的感染，如毛囊炎、疖、痈、传染性脓疱疮、丹毒、蜂窝织炎、淋巴管（结）炎、化脓性甲沟炎、皮下脓肿、汗腺炎、感染性粉瘤、慢性脓皮症。乳腺炎，肛周脓肿，外伤、手术创伤等继发感染。咽喉炎（咽喉脓肿），急慢性支气管炎，扁桃体炎（扁桃体周围炎、扁桃体周围脓肿）、支气管扩张（感染时）、慢性呼吸系统疾病继发

感染、肺炎、肺化脓症。中耳炎、鼻窦炎。肾盂肾炎、膀胱炎、胆囊炎。子宫附件炎、子宫内感染、前庭大腺炎。眼睑炎、麦粒肿、眼睑脓肿、泪囊炎、睑板腺炎。牙周炎、牙冠周炎、颌炎。敏感菌引起的感染 用法用量 成人 200 mg bid，饭后服药，应随年龄及症状适宜增减。有高度肾损害的患者，注意延长给药间隔。应指导患者将药物从PTP板取出后服用。有报道，因误服PTP板致使硬锐角部刺入食道粘膜，进一步引起穿孔并发纵隔炎等重症合并症。 注意事项 对本药成分有休克既往史的患者禁用。对青霉素类、头孢菌素类抗生素有过敏既往史的患者，本人或双亲、兄弟有支气管哮喘、皮疹、荨麻疹等过敏体质患者，严重肾功能损害者，高龄者，经口摄食不足或非经口维持营养者、全身状态不良患者慎用。有时引起休克，故应仔细问诊。对临床检验结果的影响 除试纸反应外的贝内迪克特试剂、费林氏试剂及Clinitest进行的尿糖检查，有时呈假阳性，故应注意。直接库姆斯试验有时呈阳性，故应注意。此外，有本药降低血清中肉毒碱的报告。 高龄者用药 高龄者与其他成人之间未见副作用差异，但通常高龄者生理机能减退，故应注意肾功能减退患者对本药的排泄延迟，易出现血中高浓度分布。另外，使用同类药物的高龄者有因维生素K缺乏引起出血倾向的报道。因此，应适当改变给药间隔。对妊娠和哺乳妇女的影响 尚未确立妊娠期用药的安全性，因此孕妇或可能妊娠的妇女仅在治疗的益处高于危险性时使用。对儿童的影响 尚未确立未成熟儿、新生儿、乳儿、幼儿或小儿用药的安全性（使用经验少）。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)