

抗生素类抗感染药：头孢菌素类-头孢拉宗钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_183245.htm 【摘要】

头孢拉宗钠属于头孢菌素类抗生素栏目，主要讲述了 药物名称 头孢拉宗钠 药物别名 英文名称 Cefbuperazone Sodium 说明 注射剂

：0.1g 功用作用 为头霉素衍生物，作用与头孢美唑近似，对革兰阴性菌和厌氧菌有良好抗菌作用。应用范围与头孢美唑近似 用法用量 静注或静滴，1日1~2g，重症可用4g，分为2次给药 注意事项 本...

。本文重点关注头孢 药物 作用 过敏 等内容，您可以在本页对头孢拉宗钠进行讨论【关键字】头孢菌素类抗生素.头孢.药物.作用.过敏.头孢拉宗钠【全文】

药物名称 头孢拉宗钠 药物别名 英文名称 Cefbuperazone Sodium 说明 注射剂：0.5；1g 功用作用 为头霉素衍生物，作用与头孢美唑近似，对革兰阴性菌和厌氧菌有良好抗菌作用。应用范围与头孢美唑近似 用法用量 静注或静滴，1日1~2g，重症可用4g，分为2次给药 注意事项 本品对绿脓杆菌无效。

（1）偶可致过敏，出现荨麻疹、皮疹、药热等，也还可致休克，对于曾用头孢菌素类药物过敏者，以及过敏体质者应慎用，最好能在用前进行皮试（皮试液浓度300 μg/ml），在用药过程中发生过敏症状即应停药。（2）偶可致BUN升高，停药可恢复。由于主要经肾排泄，肾功能受损者应慎用。（3）偶可致嗜酸细胞增多、白细胞减少以及红细胞减少。（4）少数病人可有氨基转移酶和碱性磷酸酶升高。（5）消化道不良反应有恶心、呕吐和腹泻等。极少数病例可致伪膜性肠炎、应予警惕。也可致念珠菌二重感染。（6）本品应用

可影响某些检验结果，如斑氏或斐林氏尿糖试验可显示假阳性、直接抗人球蛋白（Coombs）试验假阳性以及血肌酐（Jaffe法）升高。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com