

抗生素类抗感染药：头孢菌素类-头孢匹胺钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_183247.htm 【摘要】头孢匹胺钠属于头孢菌素类抗生素栏目，主要讲述了 药物名称 头孢匹胺钠 药物别名 英文名称 CefpiramideSodium 说明 0.1g 功用作用 本品系半合成的第三代头孢菌素类抗生素。本品的特点为具有广泛的抗菌谱和杀菌力，对革兰阳性菌、阴性菌及厌氧菌均有强大的抗菌活力，对 β 内酰胺酶相当稳定。为第三代头孢类抗生素。。本文重点关注头孢 MIC ml 抗菌 等内容，您可以在本页对头孢匹胺钠进行讨论 【关键字】头孢菌素类 抗生素.头孢.MIC.ml.抗菌.头孢匹胺钠 【全文】 药物名称 头孢匹胺钠 药物别名 英文名称 Cefpiramide Sodium 说明 0.5g；1g 功用作用 本品系半合成的第三代头孢菌素类抗生素。本品的特点为具有广泛的抗菌谱和杀菌力，对革兰阳性菌、阴性菌及厌氧菌均有强大的抗菌活力，对 β 内酰胺酶相当稳定。为第三代头孢类抗生素。通过与青霉素结合蛋白(PBP)的1A，1B及3有很强的亲和性，抑制细菌细胞壁的合成，从而发挥杀菌作用。对G⁺、G⁻菌具有广谱抗菌活性，尤其对绿脓杆菌具有很强的抗菌力。对绿脓杆菌的最低抑菌浓度（MIC）为0.78～3.13 μ g/ml，对金葡菌属的MIC为0.39～0.78 μ g/ml,大肠杆菌的MIC为0.39 μ g/ml，对变形杆菌属的MIC为0.05～6.25 μ g/ml。对厌氧菌中消化球菌、消化链球菌的MIC80分别为0.78 μ g/ml和0.39 μ g/ml。用于敏感菌感染引起的咽喉炎、扁桃体炎、急慢性支气管炎、肺炎、肺化脓性疾病、肾盂肾炎、膀胱炎、前列腺炎、脑膜炎及妇科感染等。用法用量 成人剂

量1g~2g/日，分2次给药，肌注、静注或静滴。小儿每日30mg~80mg/kg，分2~3次。视病情成人可增至4g/日，小儿每日150mg/kg。静注时用注射用水，生理盐水或等渗葡萄糖注射液溶解后缓慢推注；静滴一般在30~60分钟内完成。肌注时，以0.5%利多卡因注射液3ml溶解本品0.5g。注意事项有皮疹、荨麻疹、瘙痒及发热等过敏症状。过敏性休克、伪膜性肠炎罕见。偶见过敏性休克，急性肾衰等严重的肾功能障碍，伪膜性结肠炎等伴有血便的严重结肠炎，间质性肺炎，肺嗜酸细胞浸润综合征。其他不良反应还有变态反应，血液中有时出现粒细胞减少、嗜酸性白细胞增多，偶见贫血、血小板减少，肝脏中有时出现ALT、AST、AL-Pase、LDH升高，偶见胆红素和 γ -GTP升高，消化系统症状，二重感染，维生素缺乏症及其他症状。对本品有过敏史者禁用，肝、肾功能障碍者，剂量应适当调节。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com