

抗生素类抗感染药：头孢菌素类-头孢氨苄 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_183251.htm 【摘要】

头孢氨苄属于头孢菌素类抗生素栏目，主要讲述了 药物名称 头孢氨苄 药物别名 苯甘孢霉素，先锋霉素 英文名称 Cefalexin 说明片（胶囊）剂：每片（胶囊）0.125g；0.25g颗粒剂：1g：50mg。功用作用 对金黄色葡萄球菌（包括耐青霉素G菌株）、溶血性链球菌、肺炎球菌、大肠杆菌、奇异变形杆菌、克雷白杆菌（肺炎杆菌）、流感嗜血杆菌、卡他球菌等有抗菌作用。本品...。本文重点关注头孢作用 口服 小时 等内容，您可以在本页对头孢氨苄进行讨论【关键字】头孢菌素类抗生素.头孢.作用.口服.小时.头孢氨苄【全文】药物名称 头孢氨苄 药物别名 苯甘孢霉素，先锋霉素 英文名称 Cefalexin说明片（胶囊）剂：每片（胶囊）0.125g；0.25g颗粒剂：1g：50mg。功用作用 对金黄色葡萄球菌（包括耐青霉素G菌株）、溶血性链球菌、肺炎球菌、大肠杆菌、奇异变形杆菌、克雷白杆菌（肺炎杆菌）、流感嗜血杆菌、卡他球菌等有抗菌作用。葡萄球菌的部分菌株、粪链球菌、吲哚阳性变形杆菌、肠杆菌属对本品耐药。本品对绿脓杆菌无抗菌作用。本品口服吸收良好。空腹给药吸收率可达90%，口服0.25g、0.5g、1g，1小时的平均血清药浓度分别为9、18、32 μg / ml，6小时尚可测出。本品吸收后主要由尿原形排泄，8小时内可排出90%以上。口服0.25g后尿药峰浓度约1mg / ml。t_{1/2}约为0.6小时。临床上应用本品于上述敏感菌所致的呼吸道、泌尿道、皮肤和软组织、生殖器官（包括前列腺）等部位的感染，也常用于中耳炎。用法用量 成人

：1日1～2g，分3～4次服用，空腹服用。小儿：1日25～50mg/kg，分3～4次服用。 注意事项（1）对头孢菌素过敏者禁用。对青霉素过敏或过敏体质者慎用。（2）肾功能严重损害者应酌减用量。（3）服药后偶见胃肠道反应；恶心、腹泻、食欲不振等。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com