

抗生素类抗感染药：头孢菌素类-头孢噻啶（先锋 ）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_183255.htm 【摘要】

头孢噻啶（先锋 ）属于头孢菌素类抗生素栏目，主要讲述了 药物名称 头孢噻啶（先锋 ） 药物别名 先锋霉素 、 头孢利素、 头孢茈利定、 头孢菌素 、 西孢茈里丁、 先锋芦里丁、 吡噻孢霉素 Ceforin,Keflodin 英文名称 Cefaloridine 说明 每瓶：0.5g 功用作用 基本与头孢噻吩相似，但对革兰阳性菌的作用较前者强，对大肠杆菌的作用亦较强。用于...。本文重点关注头孢 先锋 作用 感染 等内容，您可以在本页对头孢噻啶（先锋 ）进行讨论【关键字】头孢菌素类抗生素.头孢.先锋.作用.感染.头孢噻啶（先锋 ）【全文】

药物名称 头孢噻啶（先锋 ） 药物别名 先锋霉素 、 头孢利素、 头孢茈利定、 头孢菌素 、 西孢茈里丁、 先锋芦里丁、 吡噻孢霉素

Ceforin,Keflodin英文名称 Cefaloridine说明 每瓶：0.5g 功用作用 基本与头孢噻吩相似，但对革兰阳性菌的作用较前者强，对大肠杆菌的作用亦较强。用于敏感菌所致的呼吸道感染、皮肤和软组织感染、泌尿道感染、胆道感染、胸腔腹腔感染，也可用于脑膜炎、败血症、胸膜炎。用法用量 成人，肌注1g～3g/日，分3～4次；静注或静滴2g～4g/日；鞘内50mg/次，1日或隔日1次。儿童，肌注每日30mg～60mg/kg，分3～4次；静注或静滴每日50mg～100mg/kg。注意事项 本品引起肾功能损害较多见，不宜与氨基甙类抗生素联用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com